

НОВАЯ КОМПЛЕКСНАЯ СИСТЕМА ОМОЛОЖЕНИЯ ИНТИМНОЙ ЗОНЫ – PINK INTIMATE SYSTEM

**Маракшин
Юрий
Кузьмич**

врач-косметолог,
гинеколог, врач
высшей категории,
специалист по
инъекционным
и лазерным
технологиям, старший
преподаватель
кафедры
«Косметология», зав.
курсом «Эстетическая
гинекология»
Московского
института ДПО
«Институт
пластической хирургии
и фундаментальной
косметологии»,
Москва



В настоящее время бурно развивается эстетическая гинекология, предмет которой – красота и здоровье кожи и слизистых аногенитальной области, а также функциональное состояние уrogenитального тракта. Пристальный интерес к здоровью и эстетической привлекательности интимной зоны был всегда, но в последние годы наблюдается особенный рост количества женщин, желающих омолодить не только лицо, но и интимную область. Как правило, улучшение качества кожи в интимной области приводит к восстановлению некоторых утраченных с возрастом функций.

Старение интимной зоны включает:

- деформацию лобковой области (увеличение объема подкожного жира на лобке);
- возрастную инволюцию жировой ткани больших и малых половых губ;
- депигментацию или гиперпигментацию кожи;
- ослабление поверхностной каркасной фасции;
- опущение и усиление растяжимости тканей;
- возрастной ксероз (сухость кожи вульвы и слизистой влагалища);
- сексуальные нарушения различного рода;
- дряблость кожи и снижение чувствительности аногенитальной зоны;
- увеличение вагинального отверстия (вульварного кольца);
- послеродовые изменения в результате разрывов, перинеотомии, грубых швов.

Современная медицина предлагает широкий спектр новейших малоинвазивных методик лечения и поддержания здоровья тела, волос, структуры кожи, ее эластичности, гидратации, тонуса, синтеза коллагена, увлажнения эпидермиса.

В случае инволюционных изменений интимной зоны для получения

эффекта необходим системный подход, включающий гормональную терапию и наружную терапию комплексом метаболитических веществ, антиоксидантов, репаратанов.

Кожные покровы лица и аногенитальной области имеют большую плотность рецепторов к половым гормонам, их недостаток или снижение сразу сказывается неблагоприятными изменениями в этих областях.

К снижению репродуктивных гормонов, которые и отвечают за красоту в молодом возрасте, приводят стрессовые ситуации, вредные привычки, неконтролируемый прием противозачаточных средств. В пожилом возрасте добавляется их естественное возрастное снижение на фоне окислительного стресса.

Перечень наиболее востребованных процедур в эстетической гинекологии:

- интимный филлинг;
- терапия интравагинальным CO₂ и эрбиевым лазерами;
- омоложение кожи вульвы и промежности методами радиоволновой и лазерной терапии, лазерная терапия перианальной области;
- нитевые технологии для уплотнения кожи и усиления каркасных функций коллагена;
- PRP-терапия;
- биоревитализация кожи вульвы и слизистой;
- применение органических препаратов.

К этому списку следует добавить новый метод терапии – систему омоложения интимной зоны. Космецевтический препарат, с помощью которого можно добиться атравматичного ремоделирования кожи на разных уровнях, – Pink Intimate System – новейшая разработка итальянской компании Promoitalia (рис. 1). Новая технология химического ремоделирования кожи и обновления коллагено-эластинового каркаса



Рис. 1. Pink Intimate System (комплексная система омоложения интимной зоны)

аногенитальной зоны является оптимальным методом коррекции различных эстетических недостатков, включая возрастные изменения кожи этой деликатной области, без повреждения эпидермиса, фроста и шелушения.

Состав препарата Pink Intimate System и его свойства

Pink Intimate System – уникальное сочетание эффективных активных компонентов для мгновенного результата.

Компоненты для лифтинга

Монохлоруксусная кислота (МХК), стабилизированная пероксидом мочевины, обеспечивает лифтинг, омоложение тканей, является оптимальной транспортной системой для активных ингредиентов.

МХК – производное уксусной кислоты. Она не агрессивна, но чрезвычайно эффективна для устранения несовершенств кожи. По химической структуре МХК обладает гидрофильным/липофильным балансом, что позволяет молекуле достигать дермы. При соединении с пероксидом мочевины кислотные свойства МХК снижаются, но резко увеличивается ее способность проникать в кожу, не повреждая дермо-эпидермальный барьер. При достижении дермального слоя процесс стабилизации МХК прерывается ферментами с образованием свободной МХК. В свою очередь, мочевина ослабляет ионные связи в молекулах гликированного коллагена и повышает его доступность для коллагеназа.



Рис. 2. Пациентка Л., 30 лет: аногенитальная зона до процедуры (А); аногенитальная зона после двух процедур с перерывом в семь дней и трехкратным нанесением Pink Intimate System на кожу во время каждой процедуры (Б)

Итог: контролируемая денатурация коллагена, приводящая к мгновенному лифтингу тканей и стимуляции фибробластов.

Компоненты для осветления гиперпигментации и выравнивания тона

Койевая кислота – органическая кислота, получаемая из ферментированного риса, используется в уходах по коррекции гиперпигментации.

Койевая кислота фактически является ложным субстратом тирозингидроксилазы – фермента, способного превратить тирозин в меланин в процессе меланогенеза. При блокировании фермента снижается производство меланина.

Структура кислоты также способна стабилизировать МХК и улучшает ее проникновение в дерму.

Глутатион – трипептидный тиол с низкой молекулярной массой. Играет основную роль в поддержании межклеточного окислительно-восстановительного баланса. Мощный антиоксидант. Открытие его антимеланогенной способности позволяет использовать глутатион в качестве осветляющего компонента. Такое действие является результатом непосредственного и опосредованного подавления тирозиназы и превращения эумеланина в феомеланин.

Руцинол (стабильное производное резорцина) – синтетическая молекула, способная решить проблему гиперпигментации. Бутил резорцин ингибирует тирозиназу, но иначе, чем койевая кислота, эффективно осветляет и выравнивает тон кожи благодаря воздействию на источник образования меланина.

Восстанавливающие, биостимулирующие и успокаивающие компоненты

Гинестеин – фитогормон, полученный из соевых бобов, по структуре сходен со структурой эстрадиола, что позволяет стимулировать ткани, чувствительные к уровню гормонов, такие как вагинальные. Гинестеин омолаживает на клеточном уровне, является сильным антиоксидантом, уменьшает перекисное окисление липидов и защищает ДНК от повреждений.

Ретинол – фоточувствительная молекула. Эффективно стимулирует синтез и репликацию клеток, действует в синергизме с гинестеином. Регулирует меланогенез, процессы ороговения клеток эпидермиса, на уровне дермы поддерживает синтез коллагена и эластина.

Папаин – протеолитический фермент, препятствует росту волос, обеспечивает легкую эксфолиацию и осветление.

Экстракт лакрицы содержит глицирризиновую кислоту, обладает противовоспалительными, иммуномодулирующими свойствами.

Бисаболол оказывает биостимулирующее, противовоспалительное, ранозаживляющее действие. Успокаивает чувствительную и раздраженную кожу.

Кобаламин (Витамин В₁₂) – активирует клеточный метаболизм, омолаживает, увлажняет, восстанавливает барьерные свойства кожи, повышает ее эластичность.

Препарат легко и абсолютно безопасно преодолевает кожный барьер без повреждения эпидермального слоя,



Рис. 3. Этапы проведения процедуры: очищение кожи обрабатываемой зоны

достигая средних и глубоких слоев дермы.

Pink Intimate System, являясь многоцелевым средством, влияет на все стадии старения кожи аногенитальной области, оказывая оздоравливающий и омолаживающий эффекты. Действие данной системы обусловлено ингредиентами, в нее входящими, и нацелено на устранение наиболее распространенных недостатков кожи интимной зоны:

- кожа уплотняется, улучшаются ее биомеханические свойства (что очень важно в этой зоне), становится бархатной на ощупь;
- повышается чувствительность эrogenных зон;
- замедляется рост волос;
- выравнивается цвет кожи, происходит ее осветление.

Эффекты реализуются исключительно на уровне дермы, оставляя интактным эпидермис.



Рис. 4. Этапы проведения процедуры: сбор необходимого количества препарата Pink Intimate System

Простота в использовании, безопасность и эффективность – основные характеристики данной системы.

Дополнительные преимущества:

- всесезонность применения;
- экономичность (для процедуры нужен всего один флакон препарата);
- затраты времени на процедуру – не более 30 минут;
- идеальное сочетание с другими вышеперечисленными методами, а также возможность монотерапии.

Протокол процедуры

Пациентка Л., 30 лет, обратилась с жалобами на неудовлетворительный, с ее точки зрения, вид кожи аногенитальной области.

При осмотре – кожа сухая, пигментированная в паховых областях и перианальной области, отмечается снижение тонуса кожи после неоднократных процедур депиляции (рис. 2А). Предложено провести корректирующее лечение с применением препарата для омоложения интимной зоны Pink Intimate System. Курс состоял из двух процедур с интервалом один раз в неделю. В каждой процедуре проводилось трехкратное нанесение препарата с последующей оценкой состояния кожных покровов этой зоны.

Этапы процедуры:

- 1) предварительное очищение кожи в зоне воздействия – (рис. 3);



Рис. 5. Этапы проведения процедуры: втирание препарата Pink Intimate System в целевые зоны аногенитальной области

- 2) равномерное нанесение 1 мл препарата на кожу с последующим легким втиранием до высыхания (рис. 4, 5);
- 3) удаление остатков препарата влажной, смоченной в воде салфеткой, просушивание кожи (рис. 6);
- 4) повторное нанесение (до трех раз), кратность нанесения Pink Intimate System зависит от толщины кожи и ожидаемого эффекта;
- 5) нанесение увлажняющего крема.

Через четыре недели произведена первая оценка состояния после двух процедур применения препарата Pink Intimate System.

Объективно: эластичность кожи и ее увлажненность улучшились, произошло осветление гиперпигментированных зон. Пациентка оценила комфортность процедуры, отсутствие периода реабилитации и хороший эстетический результат (рис. 2Б).

И в заключение

Препарат Pink Intimate System получил высокую оценку женщин разных возрастных категорий и может быть использован как врачами-косметологами, так и врачами-гинекологами, которые прислушиваются к возрастающим эстетическим запросам своих пациентов.

Как правило, курс составляет 4–6 процедур один раз в неделю. Также можно рекомендовать и как разовую процедуру с эффектом моментального подтягивания и улучшения качества кожи. ■



Рис. 6. Этапы проведения процедуры: удаление остатков препарата влажной, смоченной в воде салфеткой, просушивание кожи, подготовка к повторному нанесению Pink Intimate System