

# СХЕМА ЗАХИСТУ СОНЯШНИКУ СТІЙКОГО ДО ТРИБЕНУРОН-МЕТИЛУ



|   |  | Норма фактична   | Вартість 1 л \$ / грн | Вартість 1 га \$ / грн |
|---|--|------------------|-----------------------|------------------------|
| <b>ГЕРБИЦИДИ</b>  |  |                  |                       |                        |
| <b>ОРЕОЛ МАКСІ</b><br>хізалофоп-п-етил, 125 г/л, КЕ                         | Страховий гербіцид проти однорічних злакових   | 0,6-0,8 л/га     |                       |                        |
| <b>ГРЕНАДЕР</b><br>трибенурон-метил, 750 г/кг, ВГ                           | Системний післясходовий гербіцид проти однорічних і багаторічних дводольних бур'янів                               | 0,015-0,05 кг/га |                       |                        |
| <b>ІНСЕКТИЦИДИ</b>  |  |                  |                       |                        |
| <b>КАНОНІР ДУО</b><br>імідаклоприд, 300 г/л + лямбда-цигалотрин 100 г/л, КС | Інсектицид потрійної дії (контактна, кишкова і системна), зі швидким стоп-ефектом і тривалим періодом захисної дії | 0,05-0,15 л/га   |                       |                        |
| <b>ФОСОРГАН ДУО</b><br>хлорпірифос, 500 г/л + циперметрин, 50 г/л, КЕ       | Контактно-кишковий інсектицид із фумігантною дією і репелентними властивостями                                     | 1,0-1,5 л/га     |                       |                        |
| <b>ФУГНІЦИДИ</b>  |  |                  |                       |                        |
| <b>ПОЛІГАРД</b><br>тебуконазол, 250 г/л, КЕ                                 | Системний фунгіцид з ристрегулюючою дією   | 0,8-1,0 л/га     |                       |                        |
| <b>АЗОКСИН</b><br>азоксистробін 250 г/л, КС                                 | Фунгіцид, що володіє захисною, куративною та викорінювальною дією  | 0,4-0,6 л/га     |                       |                        |
| <b>ЦИМОКСИЛ</b><br>цимоксаніл, 300 г/кг + флутриафол, 210 г/кг, ЗП          | Двокомпонентний фунгіцид з потужним стоп-ефектом та тривалим захисним ефектом діє на справжні та несправжні гриби  | 0,4-0,5 кг/га    |                       |                        |
| <b>КАРБЕЗИМ</b><br>карбендазим, 500 г/л, КС                                 | Універсальний контактно-системний фунгіцид   | 0,5-1,5 л/га     |                       |                        |
| <b>ФЛУТРИВІТ</b><br>флутриафол, 250 г/л, КС                                 | Системний фунгіцид профілактичної та лікувальної дії   | 0,4-0,5 л/га     |                       |                        |
| <b>ПРОТРУЙНИКИ</b>  |  |                  |                       |                        |
| <b>КАНОНІР УЛЬТРА</b><br>імідаклоприд, 600 г/л, ТН                          | Високоєфективний інсектицидний протруйник  | 6,0-9,0 л/т      |                       |                        |
| <b>ДЕСИКАНТ</b>   |  |                  |                       |                        |
| <b>РЕГІСТАН</b><br>дикват (дибромід), 150 г/л, РК                           | Контактний десикант  | 2,0-3,0 л/га     |                       |                        |
| <b>АД'ЮВАНТИ</b>  |  |                  |                       |                        |
| <b>АГРОПАВ</b>  | Гетерополімерні ПАР  | 0,2 л/га         |                       |                        |
| <b>АГРОПАВ ЕКСТРА</b>   | Органосиліконові ПАР   | 0,1 л/га         |                       |                        |

Всього на 1 га  
\$ / грн

# СОНЯШНИК

## стійкий до трибенурон-метилу

ВВСН  
Фаза розвитку

|           |           |         |         |         |         |         |                           |             |          |                     |                 |         |    |
|-----------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------------------------|-------------|----------|---------------------|-----------------|---------|----|
| До посіву | 0         | 10 - 19 | 10 - 19 | 10 - 19 | 10 - 19 | 10 - 19 | 10 - 19                   | 10 - 19     | 30 - 39  | 51 - 59             | 60 - 69         | 71 - 79 | 89 |
| До посіву | До сходів | 2 лист. | 4 лист. | 6 лист. | 8 лист. | 9 лист. | Видов-<br>ження<br>стебла | Бутонізація | Цвітіння | Розвиток<br>насіння | Дозрі-<br>вання |         |    |

Грунтові шкідники

**Канонір  
Ультра**  
6,0-9,0 л/г

Однорічні та багаторічні  
дводольні бур'яни

**Гренадер 0,015-0,05 кг/га + АгроПАВ 0,2 л/га**

Однорічні злакові  
бур'яни

**Ореол Максі 0,6-0,8 л/га**

Клопи, попелиця,  
тютюновий трипс

**Канонір Дуо 0,05-0,15 л/га**

Бавовникова совка,  
соняшникова шипоноска,  
соняшникова вогнівка,  
попелиці

**Фосорган Дуо 1,0-1,5 л/га**

Пероноспороз, фомоз,  
фомопсис, септоріоз, іржа,  
слеротиніоз

**Цимоксил 0,4-0,5 л/га**

Біла і сіра гнилі, фомоз,  
борошниста роса

**Карбезим 0,5-1,5 л/га + Флутривіт 0,4-0,5 л/га**

Альтернативний пероноспороз,  
фомоз, фомопсис, септоріоз,  
іржа, слеротиніоз

**Полігард 0,8-1 л/га + Азоксин 0,4-0,6 л/га**

Десикація

**Регістан**  
2,0-3,0 л/га

Гербіциди

Інсектициди

Фунгіциди

Десикант

Протруйники