neodisher® IP Spray

Смазка для хирургических инструментов в виде спрея

Свойства:

Neodisher IP Sray основан на высокоочищенных жидких парафинах, разрешенных в немецкой фармакопее, и используется для обработки шарнирных соединений хирургических инструментов. Пленка, образующаяся на инструменте, не влияет при стерилизации паром. Neodisher IP Spray не подходит для инструментов, которые стерилизуют горячим воздухом.

Области применения:

Для обработки хирургических инструментов

Применение/дозировка:

Направить струю распылителя непосредственно в область шарнирных соединений хирургических инструментов. Баллончик держать вертикально. Не смешивать с другими продуктами.

Заключения:

Активные вещества зарегистрированы FDA (№17621,177120,172878)
Отчет по токсикологическому профилю по запросу.
Соответствует токсикологической безопасности (EN ISO 10993-1)

Состав:

Составляющие в соответствии с рекомендациями ЕС для моющих и чистящих средств 89/542/EWG:
<5% неионогенные ПАВ
>30%алифатические углеводороды (жидкий медицинский парафин DAB, другие алифатические углеводороды), пропилен.

CE-стандарт:

Neodisher IP Spray соответствует требованиям закона о медицинских принадлежностях, согласно европейским директивам 93/42 EC.

Информация по хранению:

Температура хранения от 5 до 25°C.
Срок хранения 4 года, при соблюдении условий хранения.

Меры предосторожности и советы по технике безопасности:

Классификация и маркировка в соответствии с Законом изготовления опасных веществ 99/45/EC для поставляемых концентратов.

Этикетка на продукте соответствует Рекомендациям по аэрозолям 75/324 EEC.

Символ опасности: **F+** легко воспламеним

Указания об опасности:

R 12	- Крайне огнеопасен

Упаковка находится под давлением. Предохранять от прямых солнечных и нагревания свыше 50°C. После использования не сжигать и не вскрывать.

Советы по технике безопасности:

S 16	- Хранить вдали от источников огня. - Не курить.
S 23	- Не вдыхать газ/дым/пары/аэрозоль
S 51	- Использовать только в хорошо проветриваемых помещениях.
S 67	- Испарения могу т вызывать сонливость и головокружение

DR. WEIGERT