



Многокомпонентное минеральное удобрение для почвы, предназначенное для подкормки черники в первый год после посадки и в последующие годы выращивания. Важным преимуществом FloGovita для черники является способность подкислять почву, что явно способствует росту и развитию растений, требующих кислой почвы. Удобрение предотвращает хлороз листьев в период вегетации растений. Кроме того, препятствует вымыванию питательных веществ грунтовыми водами

#### Способ применения:

**Голубика.** Подкормка начинается весной в начале роста растений, то есть обычно в середине апреля. Второе и третье внесение удобрения должно проводиться с интервалом в четыре недели. Последняя подкормка должна быть произведена не позднее 15 июня. Удобрения следует аккуратно перемешать с верхним шаром почвы, хорошенько полить

**Норма внесения:** первый год после посадки - трижды по 20 г/м<sup>2</sup> всего 60 г/год; последующие годы выращивания - трижды по 30-35 г/м<sup>2</sup> всего около 100 г/год.

**Рододендроны.** Норма внесения: 25-50 г удобрения используется для посадки 1 на растение (смешивая его с 25-50 л почвы из лунки). В последующие годы удобрение вносят под крону ранней весной: в 1-й год - в марте и апреле по 20 г; через 2 года в марте и апреле около 25 г; в последующие годы в марте около 30 г и в апреле около 30 г.

**Азалии.** Норма внесения: при посадке удобрение мешать с грунтом из расчета 10 г на 10 л грунта. В последующие годы в апреле, около 10 г вносят под крону и обильно поливают. Для растений 3-4 года и старше внесение удобрений повторяют 2-3 месяца в той же дозировке. При выращивании в контейнерах на 1 литр почвы берут 1 г удобрения, не следует превышать норму.

**Папоротники и хвойные.** Эти растения могут быть подкормлены Флоровитом для предпосевной и подкормки. Перед вегетацией растений удобрение смешивают с грунтом из расчета около 10 г удобрения с 10-20 л почвы. В последующие годы около 10 г удобрения вносят под крону ранней весной. Под хвойными деревьями доза внесения удобрений зависит от возраста растения: оно увеличивается до 20 г, когда растение достигает 0,5 м в высоту; до 40 г, когда растение достигает 1 м в высоту; до 60 г, когда растение достигает 2 м в высоту.

Одна столовая ложка содержит в среднем 10 г удобрения.



Багатокомпонентне мінеральне добриво для ґрунту, призначене для підживлення чорниці в перший рік після посадки і в наступні роки вирощування. Важливою перевагою FloGovit для чорниці є здатність закисляти ґрунт, що явно сприяє росту і розвитку рослин, що потребують такого рівня кислотності ґрунту. Добриво запобігає хлорозу листя в період вегетації рослин. Крім того, перешкоджає вимиванню поживних речовин ґрунтовими водами

#### Спосіб застосування:

**Чорниця.** Підживлення починається навесні на початку росту рослин, тобто зазвичай в середині квітня. Друге і третє внесення добрива має проводитися з інтервалом в чотири тижні. Останнє підживлення повинно бути проведено не пізніше 15 червня. Добрива слід акуратно перемішати з верхнім шаром ґрунту, і гарно полити.

**Норма внесення:** перший рік після посадки - тричі по 20 г/м<sup>2</sup>, всього 60 г/рік; наступні роки вирощування - тричі по 30-35 г/м<sup>2</sup>, всього близько 100 г/рік.

**Рододендрони.** Норма внесення: 25-50 г добрива використовується для посадки 1 на рослину (змішуючи його з 25-50 л ґрунту з лунки). У наступні роки добриво вносять під крону ранньою весною: в 1-й рік - в березні і квітні по 20 г; через 2 роки в березні і квітні близько 25 г; в наступні роки в березні близько 30 г і в квітні близько 30 г

**Азалиї та пустки.** Норма внесення: при посадці добриво змішують з ґрунтом з розрахунку 10 г на 10 л ґрунту. У наступні роки в квітні, близько 10 г вносять під крону і рясно поливають. Для рослин 3-4 роки і старше внесення добрив повторюють 2-3 місяці в тому ж дозуванні. При вирощуванні в контейнерах на 1 літр ґрунту беруть 1 г добрива, не слід перевищувати норму.

**Папороті і хвойні.** Ці рослини можуть бути підживлені Флоровітом безпосередньо перед посівом або висадкою, а також і в майбутньому для підживлення рослин. Перед вегетацією рослин добриво змішують з ґрунтом з розрахунку близько 10 г добрива з 10-20 л ґрунту. У наступні роки близько 10 г добрива вносять під крону ранньою весною. Під хвойними деревами доза внесення добрив залежить від віку рослини: воно збільшується до 20 г, коли рослина досягає 0,5 м у висоту; до 40 г, коли рослина досягає 1 м у висоту; до 60 г, коли рослина досягає 2 м у висоту.

Одна столова ложка містить в середньому 10 г добрив



**КЛІОМА СЕРВІС**™  
розсадник ягідних рослин



**Добриво Florovit для  
лохини, рододендронів,  
азалій (1 кг)**

Сайт [klioma.com.ua](http://klioma.com.ua), [kliomaservice.in.ua](http://kliomaservice.in.ua)

Україна, Волинська обл., м. Ківерці

050 168 14 08, 098 955 35 36, 063 92 52 345

ОММА СЕР

розсадник ягідних росл