



### Стандартна схема.

<b>YaraVita</b>			YaraVita Universal Bio, 2-5 л/га						
<b>YaraLiva</b>	Позакореневе внесення				*YaraLiva Calcinit 5кг/га+ YaraTera Rexolin ABC, 0,5 кг/га (2 р x 7дн)		*YaraLiva Calcinit 5 кг/га кожні 10-14 днів на чергуванні з Kristalon, 6-12-36		YaraTera Rexolin ABC, 0,5 кг/га (2 р x 7дн) YaraTera Kristalon, 18-18-18 (3 кг/га) 3 тижня після збору врожаю
<b>YaraTera</b>			YaraTera Kristalon, 18-18-18 3 кг/га				YaraTera Kristalon, 6-12-36 (3 кг/га) кожні 10-14 днів		
		Початок вегетації	Розвиток пагонів	Формування суцвіть	Початок цвітіння	Цвітіння	Наливання ягід	Дозрівання ягід	Після збирання
<b>Фаза</b>									
<b>YaraMila</b>	Внесення в ґрунт.	YaraMila Cropcare/ Complex, 200 кг/га							
<b>YaraLiva</b>					YaraLiva Nitrobor, 100-150 кг/га				YaraLiva Nitrobor, 100кг/га

\*Ні в якому разі не застосовувати YaraLiva Calcinit в баковій суміші з іншими добривами.

Це загальні рекомендації. Альтернативні норми можуть коригуватися залежно від аналізу ґрунту, тканин рослини, видимого дефіциту елементів, сортових особливостей, тощо.