



Стандартна схема.

YaraVita	Позакореневе внесення		YaraVita Brassitrel Pro 2л/га (7днів після YaraTera Kristalon, 13-40-13)	YaraVita Universal Bio 2-5н/га	YaraVita Brassitrel Pro 2л/га			
YaraLiva						*YaraLiva Calcinit 5 кг/га кожні 10-14 днів на переміну з Kristalon, 6-12-36	*YaraLiva Calcinit 5кг/га 3х (кожні 7 днів)	
YaraTera			YaraTera Kristalon, 13-40-13 3кг/га	YaraTera Kristalon, 18-18-18 3кг/га		YaraTera Kristalon, 6-12-36 (3 кг/га)		
Фаза		Початок вегетації	2-4 тижні після посадки	Період інтенсивного росту листя	Бутонізація-цвітіння	Наливання плодів	Дозрівання плодів	
YaraMila	Внесення в ґрунт.	YaraMila Cropcare/Complex, 400-600 кг/га						
YaraLiva			YaraLiva Nitrabor, 150-200кг/га		YaraLiva Nitrabor, 150 кг/га			

Це загальні рекомендації. Альтернативні норми можуть коригуватися залежно від аналізу ґрунту, тканин рослини, видимого дефіциту елементів живлення, сортових особливостей, тощо.

**Ні в якому разі не застосовувати YaraLiva Calcinit в баковій суміші з іншими добривами.