

Краплі інсектоакарицидні Бар'єр супер (краплі для зовнішнього застосування)

Опис

Прозора масляниста рідина зі специфічним запахом складових компонентів.

Склад

1 мл препарату містить діючу речовину:

фіпроніл – 80 мг.

Допоміжні речовини: пропіленгліколь, гліцерин, спирт ізопропіловий.

Фармакологічні властивості

ATCvet QR53, ектопаразитициди, інсектициди і репеленти (QR53AX15, фіпроніл).

Діюча речовина препарату фіпроніл -5-аміно-1-[2,6-дихлоро-4-(трифлуорометил)феніл]-4-(трифлуорометил)сульфініл]-1Н-піразол-3-карбонітрил, похідна фенілпіразолу.

Фіпроніл уражає центральну нервову систему ектопаразитів, не впливаючи на центральну нервову систему тварин. Механізм дії фіпронілу у безхребетних полягає в гальмуванні проходження іонів хлору в ГАМК-залежних хлоридних каналах, що порушує роботу нервової системи. Через системне блокування фіпронілом нервової системи настає нервово-перезбудження і загибель ектопаразитів.

Фіпроніл виявляє контактну дію і практично не всмоктується через шкіру. Після місцевого нанесення препарат розподіляється по поверхні тіла протягом 24 годин, накопичується в епідермісі, сальних залозах, волосяних фолікулах і поступово вивільнюється. Створюється ефект “резервуару”, що забезпечує тривалу залишкову активність фіпронілу.

Застосування

Профілактика і лікування собак та котів при хворобах, спричинених ектопаразитами: блохами (*Stenoccephalus spp.*), паразитоформними кліщами (*Dermacentor spp.*, *Rhipicephalus spp.*, *Ixodes spp.*), вошами (*Trichodectes canis*, *Felicola subrostratus*).

Препарат також ефективний при вушній корості (отодектозі).

Дозування

Препарат застосовують зовнішньо, наносять безпосередньо на шкіру піпеткою-крапельницею у місця, недоступні для злизування, собакам у ділянку холки та вздовж хребта, котам – у ділянку потилиці у дозах:

Цуценятам та кошенятам: 0,5 мл препарату;

Котам: 1 мл препарату;

Собакам: масою тіла 2-10 – 1 мл препарату;

масою тіла 10-20 кг – 2 мл препарату;

масою тіла 20-40 кг – 3 мл препарату;

масою тіла понад 40 кг – 4 мл препарату.

Препарат наносять одноразово. Профілактичний ефект триває протягом 1,5-2 місяців. По закінченні цього терміну при необхідності обробку тварин повторюють.

При лікуванні отодектозу препарат закапують у зовнішній слуховий прохід у дозі 2-3 краплі. Обробку проводять 2-3 рази з інтервалом 8-10 діб.

Протипоказання

Підвищена чутливість до фіпронілу або інших складових компонентів препарату!

Не застосовують препарат кошенятам до 12-тижневого віку, цуценятам до 10-тижневого віку!

Не застосовують препарат виснаженим та старим тваринам!

Не застосовують препарат вагітним та лактуючим тваринам!

Застереження

Особи, які працюють з препаратом, повинні дотримуватися основних правил гігієни та безпеки, прийнятих при роботі з ветеринарними препаратами.

Після обробки тварин препаратом ретельно вимити руки з милом. Впродовж 48 годин після обробки тварин не гладити і не купати.

Форма випуску

Полімерні ампули-крапельниці по 0,5 мл (для цуценят та кошенят) та 1 мл (для дорослих собак та котів).

Зберігання

У сухому захищеному від світла місці при температурі не вище 25 °С.

Термін придатності

2 роки.