

**Енроксил® 5 %**  
**(порошок для перорального застосування)**  
листівка-вкладка

**Опис**

Сипучий порошок жовтуватого кольору.

**Склад**

100 г препарату містить діючу речовину:

енрофлоксацин – 5 г.

Допоміжні речовини: лактози моногідрат, кремнію діоксид колоїдний безводний.

**Фармакологічні властивості**

Енрофлоксацин належить до групи фторхінолонів нового покоління, проявляє протимікробну дію шляхом гальмування активності ферменту ДНК-гірази, який є надзвичайно важливим каталізатором реплікації ДНК у бактеріальній клітині, запобігає, таким чином, розвитку паралельної резистентності. Він ефективно діє проти більшості патогенних мікроорганізмів: *Mycoplasma spp.*, *E. coli*, *Salmonella spp.*, *Campylobacter spp.*, *Haemophilus spp.*, *Pasteurella spp.*, *Bordetella spp.*, *Erysipelothrix rhusiopathiae*, *Klebsiella spp.*, *Proteus spp.*, *Vibrio parahaemolyticus*, *Staphylococcus aureus*, *Streptococcus spp.* і ентерококи.

**Застосування**

Свійська птиця (кури-бройлери, племінні кури, ремонтний молодняк, індики): лікування птиці при захворюваннях травного каналу та органів дихання (колі-інфекція, пастерельоз, інфекційний пташиний риніт, сальмонельоз, стафілококоз, кампілобактеріоз, мікоплазмоз), що спричинені мікроорганізмами, чутливими до енрофлоксацину.

Свині: лікування тварин при захворюваннях травного каналу та органів дихання (пастерельоз, ензоотична пневмонія, бактеріальна бронхопневмонія, колідиарея, колісептицемія, сальмонельоз, ММА-синдром, атрофічний риніт), що спричинені мікроорганізмами, чутливими до енрофлоксацину.

**Дозування**

Перорально з кормом у дозі:

свійська птиця (кури-бройлери, племінні кури, ремонтний молодняк, індики – 2 кг препарату на 1 т корму протягом 3 діб. Тривалість лікування при сальмонельозі становить 5 діб;

свині – 1, 5 кг препарату на 1 т корму (2,5 мг енрофлоксацину на кг маси тіла) протягом 3 діб; 3 кг препарату на 1 т корму (5 мг енрофлоксацину на кг маси тіла) протягом 5 діб при сальмонельозі та ускладнених інфекціях органів дихання.

**Протипоказання**

Підвищена чутливість до енрофлоксацину.

Не застосовувати при виявленні стійких штамів патогенних бактерій, резистентних до хінолонів. Не застосовувати курам-несучкам, яйця яких призначені для споживанням людям.

Не застосовувати одночасно з антибіотиками групи тетрацикліну, хлорамфеніколом та макролітами. Не застосовувати з теофіліном і не стероїдними протизапальними засобами.

**Застереження**

Забій тварин на м'ясо дозволяється через 7 діб (кури-бройлери, племінні кури, ремонтний молодняк), 10 діб (індики) та 5 діб (свині) після останнього застосування препарату. Отримане до зазначеного терміну м'ясо утилізують або згодовують непродуктивним тваринам залежно від висновку лікаря ветеринарної медицини.

**Форма випуску**

Пакети з тришарової фольги по 100 г та 1 кг. Паперові мішки по 25 кг.

**Зберігання**

Сухе, темне, захищене від дітей місце в оригінальній упаковці при температурі від 5° до 25°С.  
Термін придатності – 3 роки.

Після першого відбору препарат необхідно використати протягом 3 місяців за умови зберігання в оригінальній упаковці при температурі від 5 ° до 25 °С

**Для застосування у ветеринарній медицині!**

**Власник реєстраційного посвідчення:**

КРКА, д.д., Ново место  
Шмар'єшка цеста 6,  
8501 Ново место,  
Словенія.

KRKA, d.d., Novo mesto, Slovenia  
Šmarješka cesta 6,  
8501 Novo mesto,  
Slovenia

**Виробник готового продукту**

КРКА, д.д., Ново место  
Шмар'єшка цеста 6,  
8501 Ново место,  
Словенія.

KRKA, d.d., Novo mesto, Slovenia  
Šmarješka cesta 6,  
8501 Novo mesto,  
Slovenia