

Інструкція

Папілостоп (Papilostop)

Засіб профілактичний з догляду за шкірою тіла

Багато людей страждають від новоутворень на шкірі. Якщо спочатку це лише неприємні дефекти, згодом їх стає все більше. І, звісно, якщо вірус папіломи розвивається, слід зупинити цей процес і завадити появі нових бородавок на шкірі. Якщо ви з власного досвіду знаєте, що це за проблема, вам допоможе засіб Папілостоп (Papilostop). Він усуває бородавки, папіломи та натоптиші, сприяє нормалізації стану дерми. Завдяки швидкій дії засобу ви зможете позбутися дефектів на шкірі в найкоротший термін.

Папілостоп (Papilostop) – кератолітичний засіб. До його складу входять:

Екстракт чистотілу – містить близько двадцяти речовин, що мають бактерицидні й антибактеріальні, протигрибкові, противірусні властивості. Активні речовини чистотілу згубно впливають на більшість патогенних організмів. Оцтова кислота – має кератолітичну дію, виявляє слабку протимікробну активність. Молочна кислота – викликає хімічну деструкцію бородавок, папілом, натоптишів. Екстракт лука – має бактерицидні й антисептичні властивості, бореться з вірусами. Екстракт прополісу – має антибактеріальні, протизапальні, антибіотичні й протигрибкові властивості, тому його використовують для лікування багатьох дерматологічних захворювань, у тому числі папілом і бородавок. Екстракт прополісу покращує регенерацію тканин, пригнічує процес утворення рубців, прискорює відновлення епідермісу.

Показання до застосування: видалення папілом, бородавок, натоптишів (сухих мозолів).

Спосіб застосування:

Папілостоп (Papilostop) призначений виключно для зовнішнього застосування!

Перед використанням визначити дефект шкіри (бажано проконсультуватися у лікаря!). Відкрити зовнішню та внутрішню кришки флакона та ретельно перемішати вміст флакона дерев'яним аплікатором (знаходиться в упаковці). Щоб уникнути розтікання та потрапляння на здорову шкіру, перед використанням рекомендується змастити шкіру навколо оброблюваної ділянки жирним кремом, вазеліном і захистити пластиром. При обробці ділянок поблизу слизових оболонок або очей (можливе виникнення набряку сітківки, що може негативно позначитися на гостроті зору) необхідно дотримуватися особливої обережності. При нанесенні засобу біля очей очі мають бути заплющені протягом 10-15 хвилин. За допомогою аплікатора нанести засіб локально безпосередньо на оброблювану ділянку, уникаючи потрапляння розчину на сусідні ділянки здорової шкіри й слизові оболонки. Після нанесення препарату необхідно дочекатися його повного висихання (протягом 10-15 хвилин) і не змивати протягом найближчих 8 годин.

Особливості застосування:

На дрібні папіломи (завбільшки до 2 мм) Папілостоп (Papilostop) наносять однократно тонким шаром локально на уражену ділянку.

Великі папіломи, бородавки, натоптиші (сухі мозолі) (завбільшки 2-3 мм) вимагають 2-3 обробок товстим шаром з інтервалом в один день.

Протягом декількох днів після нанесення оброблювана ділянка набуває темно-коричневого забарвлення і висихає з утворенням струпа.

Не слід видаляти струп нігтем або інструментально. Для нормального процесу загоєння і уникнення наступного виникнення рубців струп має відвалитися самостійно.

При обробці ділянок в області складок і в місцях тертя, дочекавшись повного висихання, заклеїти ділянку пластиром, який потрібно видалити не пізніше ніж за 8 годин.

Повне відновлення тканини відбувається протягом 2-4 місяців після застосування препарату.

Побічні ефекти:

Можлива поява шкірних реакцій у вигляді почервоніння та нетривалого печіння. Можлива зміна пігментації шкіри та розвиток рубців у місці застосування засобу Папілостоп (Papilostop) (цей ефект спостерігався вкрай рідко).

Слід уникати потрапляння в очі, на слизові оболонки носа, ротової порожнини тощо, а також на відкриті рани.

При неакуратному нанесенні засобу можливі опіки шкіри. При випадковому потраплянні на шкіру слід негайно протерти цю ділянку вологим тампоном, видаливши засіб. При виникненні опіку рекомендується застосовувати протиопікові та загоювальні засоби.

При випадковому потраплянні засобу в очі відразу ж промити місце ураження великою кількістю води та негайно звернутися до офтальмолога.

Протипоказання: продукт не слід застосовувати дітям, вагітним і жінкам у період лактації, за підвищеної чутливості до компонентів продукту.

Не є лікарським засобом. ТУ У 20.4-2838403931-001:2017

Виробник: ТОВ «АРТМІК ГРУП», Україна, 65026, м. Одеса, вул. Грецька, буд. 44.

Адреса потужностей виробництва: ПП «ЄВРО-ПЛЮС», 52072, Дніпропетровська обл., Дніпровський район, с. Старі Кодаци, вул. Аеропорт, буд. 70.

Строк придатності: 36 місяців.

Строк придатності після відкриття флакона: 3 місяці.

Умови зберігання: у сухому місці за температури від + 5°C до + 25°C та відносної вологості повітря не більше 75 %. Зберігати в недоступному для дітей місці.