

Мікродобриво Stim Agro «Цинк 75»

Stim Agro «Цинк 75» - амінокислотний хелат, призначений для компенсації дефіциту цинку в рослинах.

Містить збалансований комплекс органічних кислот і амінокислот, забезпечує швидке засвоєння цинку і додаткове живлення рослин. Містить амінокислоти - гліцин, аланін, аргінін; органічні кислоти - лимонна, саліцилова, малінова, малеїнова, бурштинова, бензойна.



Добриво розроблено для ринку США, випускається під торговою маркою Sunshine Boosters (<https://sunshineboosters.com/>).

Захищено US патентом: US Provisional Patent «Plant growing compositions and methods comprising a controlled environment and customized nutrition system to create optimal conditions for plants development». Патент США «Композиції та способи для вирощування рослин, що включають контрольовану середу і індивідуальну систему підживлення для створення оптимальних умов для розвитку рослин».



На Україні добрива Sunshine Boosters випускаються за ліцензією TopTropicals LLC (Флорида, США) під торговою маркою **Stim Agro** компанією ПП "Електросервіс", м. Світловодськ, Кіровоградська обл.

Stim Agro «Цинк 75»	
Масова частка амінокислот, г / л, не менше:	160
Масова частка органічних кислот, г / л, не менше:	60
Масова частка загального азоту, г / л, не менше:	30
Масова частка фосфору, г / л, не менше:	1
Масова частка калію, г / л, не менше:	5
Масова частка Zn, г / л, не менше:	75
Масова частка SO ₃ , г / л, не менше:	60
pH 1% водного розчину:	5,5-6,5

Галузь застосування

Застосовується для позакореневого обробки при профілактиці з недовліком цинку.

- Збільшує приріст зеленої маси рослин і стимулює коренеутворення
- Збільшує синтез протеїнів
- Позитивно впливає на синтез хлорофілу і інтенсивність фотосинтезу рослин
- Збільшує інтенсивність цвітіння і кількість зав'язі
- Сприяє збільшенню розмірів плодів і їх якості

Культури: для всіх типів культур

Спосіб обробки: позакореневе внесення (по листу).

Норми витрати: профілактика - 2 мл / л води, при явному ознаці дефіциту цинку - 2-4 мл / л води, в залежності від тяжкості захворювання.

При польовому внесенні: 2 л / га.

Частота внесення: 7-14 діб при ознаках нестачі Zn, 2-5 профілактичних обробки за сезон.

Рекомендується обробляти рослини вранці або ввечері, при температурі 10-25 ° С.

Норми витрати робочого розчину:

200-400 л / га для польових культур

300-1000 л / га для плодово-ягідних дерев, кущів, виноградників і овочів.

За консультацією щодо сумісності з ЗЗР та фазами внесення для будь-яких культур - звертайтеся до фахівців Stim Agro.

Сумісність

Stim Agro «Цинк 75» сумісний з основними ЗЗР при використанні в бакових сумішай.

Рекомендується додаткове тестування змішуванням розбавлених розчинів.

Stim Agro «Цинк 75» сумісний з NPK добривами, борними добривами, розчинами солей магнію і кальцію, хелатними мікродобривами. При високих добавках фосфатів в воду для обробки можливе утворення осаду, потрібно тестування методом попереднього змішування розбавлених розчинів.

Не рекомендується спільне використання з гуматами, діамофосом.

Зберігання

Гарантований термін зберігання - не менше 24міс, в тарі виробника.

Термін придатності до вживання робочих (розбавлених) розчинів - не більше 6 годин.

Країна виробник: **Україна**