



Чому екологічний контроль такий важливий в свинарстві?

Наслідки теплового стресу у свиней

Репродуктивні наслідки

- Збільшення загибелі ембріонів (при ранній супоросності)
- Збільшення мертвародженості (при пізній вагітності)
- Зменшення кількості поросят на свиноматку в посліді
- Підвищена смертність свиноматок
- Зниження швидкості заплідненості

Наслідки шлунково-кишкового тракту

- Гіпоксія
- Порушення цілісності кишечника
- Збільшення циркуляції ЛПС
- Діарея

Метаболічні наслідки

- Зниження споживання корму
- Впливає на чутливість до інсуліну
- Ожиріння



Дисбаланс електролітів

- Надмірне споживання води
- Втрата електролітів із сечею
- Діарея

Кислотно-лужний дисбаланс

- Почастішання дихання
- Респіраторний алкалоз
- Метаболічний ацидоз

Теплообмін між свинею і її оточення та стратегії охолодження



October 2018, Animal Frontiers 9(1), DOI: 10.1093/af/vfy035

Композиція з Aflorin® P L

Ментол

- Непостійні
- Заспокійливий
- Антибактеріальний
- Стимулює апетит
- Сприяє легкому диханню
- Зменшити запалення слизу



Евкалипт

- Антибактеріальний
- Сприяє видиху бронхам
- Протівірусні ліки
- Сприяє виведенню слизу з легень



Рослинні стерини сапонін

- Емульгатор
- Зв'язує вільний аміак з повітря
- Покращує всмоктування поживних речовин
- Допомога щодо диспергування частинок
- Сприяють швидкому відновленню



Переваги застосування Aflorin® PL у свиней

- Відчуття охолодження (вдихання, ковтання або нанесення на шкіру)
- Вплив на холодові рецептори, перешкоджаючи переміщенню кальцію через клітинну мембрану і здатність хімічно запускати чутливі до холоду рецептори TRPM8 в шкірі.
- Під час теплового стресу зберігайте споживання корму:
 - Позитивний вплив на продуктивність росту
 - Профілактика нерегулярного годування та перегодовування та, як наслідок, проблем з клостридіями
- Підтримуюча терапія при проблемах з диханням (PRRS, App, Mhuo тощо)

Переваги застосування Aflorin® PL

- Зменшення ембріональної загибелі та мертвародженості
- Зниження ризику затримки внутрішньоутробного розвитку
- Збільшення споживання корму
- Зниження смертності

Застосування та дозування:

- Тепловий стрес: Розпилення/туманом, двічі на день
- Загальний стрес: За тиждень до забою та під час транспортування свиней: змочіть тварин протягом 5-10 хвилин під час або після навантаження, якщо температура вище 29 °C.
- Проблеми з диханням (PRRS, App, Mhuo тощо): Профілактичне застосування: 1-2 дні на тиждень від відлучення до 10 (12) тижневого віку
- Підтримуюче лікування: 3-5 днів поспіль

Свиноматки:

- Тепловий стрес: Обприскування/туманом, двічі на день
- Опорос і лактація: Індивідуальне обприскування свиноматки

Застосування спреєм



Доза:

Питна вода: 150 – 200 мл/1000 л

Спрей: 100 – 150 мл/10 л



Innovad nv/sa

Sales & Customer Services : Cogels Osylei 33, 2600 Berchem, BELGIUM

Production & Laboratory : Postbaan 69, 2910 Essen, BELGIUM

info@innovad-global.com – Tel. +32(0) 3 667 16 55

www.innovad-global.com