

Вища ліга садівництва



 **Miravic®**

syngenta®

СХЕМА ЗАХИСТУ ЯБЛУНІ ВІД ХВОРОБ ПРЕПАРАТАМИ КОМПАНІЇ «СИНГЕНТА»




СХЕМА ЗАХИСТУ ПЕРСИКА ПРЕПАРАТАМИ КОМПАНІЇ «СИНГЕНТА»





СХЕМА ЗАХИСТУ ЧЕРЕШНІ ПРЕПАРАТАМИ КОМПАНІЇ «СИНГЕНТА»



Міравіс®: унікальний широкий спектр контролю захворювань на різних плодових культурах

Останнім часом на ринку фунгіцидів з'являються препарати, у складі яких є активна речовина з класу SDHI. Найновіший на сьогодні SDHI — підіфлуметофен (комерційна назва АДЕПІДИН™). Його створено 2016 року. Препарати, в основі яких є ця діюча речовина, мають особливі властивості, що відрізняють їх від інших препаратів.

Паспорт препарату

 Повна назва	 Вміст діючої речовини	 Хімічна група	 Препаративна форма	 Клас токсичності	 Упаковка
Міравіс® 200 SC, к. с.	200 г/л Адепідину™	Карбоксаміди (SDHI)	Концентрат суспензії	II	1 л

Застосування препарату

Культура, що обробляється	Норма витрати препарату	Об'єкт, проти якого обробляється	Спосіб, час обробок, обмеження	Строк останньої обробки (в днях до збирання врожаю)	Максимальна кратність обробок
Черешня	0,4–0,5	Кокомікоз, моніліальний опік, гниль плодів	Обприскування в період вегетації	40	2
Яблуна	0,2–0,25	Парша, борошниста роса, моніліоз, альтернаріоз			
Персик	0,5	Моніліоз, клястероспоріоз борошниста роса			
	0,75	Кучерявість листя			

АДЕПІДИН™. Механізм проникнення й розподілу в рослині

Адепідин™ потрапляє на поверхню листка і швидко поглинається рослиною

Швидке поглинання у восковому шарі утворює резервуари

Повільний рух у тканину листя


Несуттєва ксилемна системність

Листова поверхня

Восковий шар

Тканина листка

Восковий шар



Концентрація Адепідин™

Головні переваги Міравіс®

- Найвищий біохімічний потенціал серед класу SDHI-продуктів
- Містить унікальний карбоксамід із хімічної групи N-метокси-піразол-карбоксамідів
- Новий унікальний механізм дії
- Тривалий захист від ключових хвороб
- Трансламінарний ефект із локально-системною дією, що забезпечує подовжений захист
- Основа антирезистентної стратегії — унікальний партнер для бакових сумішей
- Неперевершена стійкість до змивання опадами
- Ефективний у складних погодних умовах — до +35 °C та при вологості понад 80 %
- Не викликає фітотоксичності

Сумісність: Препарат можна змішувати з іншими загальнозовживаними пестицидами на відповідній культурі. Сумісний із більшістю фунгіцидів та інсектицидів. У кожному конкретному випадку слід проводити тести на сумісність.

У світі Міравіс® у саду використовують без додаткових партнерів у препаративній формі. Це робить препарат гнучкішим у захисті саду, адже тоді його можна змішувати з контактними або системними фунгіцидами, як-от Скор®. Це забезпечує кращу лікувальну дію суміші в період зараження, яке вже відбулося.

+12 °C

+24 °C

ОПТИМАЛЬНА ТЕМПЕРАТУРА ЗАСТОСУВАННЯ

800 л/га

1200 л/га

РЕКОМЕНДОВАНА НОРМА ВИТРАТИ РОБОЧОГО РОЗЧИНУ

Спектр дії препарату Міравіс® у багаторічних насадженнях



ЯБЛУНЯ



ПАРША ЯБЛУНІ



БОРОШНИСТА РОСА



МОНІЛІОЗ



АЛЬТЕРНАРІОЗ



ЧЕРЕШНЯ



ГНИЛЬ ПЛОДІВ



МОНІЛІАЛЬНИЙ ОПІК



КОКОМІКОЗ



ПЕРСИК



КЛЯСТЕРОСПОРІОЗ



МОНІЛІОЗ




КУЧЕРЯВІСТЬ ЛИСТЯ



БОРОШНИСТА РОСА

Ефективність препарату проти основних хвороб яблуні, персика, черешні



Полюва ефективність у балах

- | | |
|-----------------------------------|-------------|
| 4 — відмінно, 95–100 % | 2 — помірна |
| 3 — надійна ефективність, 90–95 % | 1 — слабка |

Особливості застосування продукту

- Діюча речовина препарату Міравіс® майже повністю абсорбується рослиною протягом 1 год, що унеможливає змивання опадами. Потрапляючи на рослину, АДЕПІДИН™ рівномірно розподіляється в листках і пересувається акропетально, крім того, чимала його кількість міцно зв'язується з восковим шаром і дозовано потрапляє в тканини рослин, забезпечуючи в такий спосіб тривалий захист. Такий розподіл діючої речовини в рослині забезпечує тривалу фунгіцидну активність і високу ефективність Міравіс®.
- Тривалість захисного періоду залежить від норми продукту, термінів застосування препарату, ступеня інфекційного навантаження і може становити від 10–14 днів.
- Щоб досягнути кращого ефекту, фунгіцид рекомендується застосовувати профілактично або за умови можливого зараження (після дощів, при високій вологості повітря, в умовах тривалої посухи, збільшення термінів між обробками тощо).
- Усі SDHI вимагають грамотного підходу до внесення, тому слід подбати про антирезистентну програму захисту свого саду. Якщо в системі захисту саду понад 16 фунгіцидних обробок, максимальна кількість застосувань препаратів із групи SDHI — не більше як чотири рази за сезон, згідно з рекомендаціями FRAC.
- Рекомендується чергувати Міравіс® з фунгіцидами інших хімічних груп (Циделі™ Топ, Скор®, Хорус®) або з контактними фунгіцидами.
- Міравіс® — надійний засіб для запобігання резистентності до основних збудників грибкових хвороб завдяки використанню унікальної молекули АДЕПІДИН™, яка не має аналогів на ринку.