

активных осадков, при употреблении в пищу свежего молока.

Противорвотное средство, гнездо № 7, пенал голубого цвета. Принять 1 таблетку сразу после облучения, а также при появлении тошноты после ушиба головы.

Примечание. Детям до 8 лет на один прием дают $\frac{1}{4}$ таблетки (кроме радиозащитного средства № 2).

Детям от 8 до 15 лет — $\frac{1}{2}$ таблетки.

Противоболевое и радиозащитное средство № 2 даются в полной дозе.

Дата укомплектования 1275 _____ месяц, год.

Серия № 271

Хранение: в сухом месте, вдали от источников тепла (не менее 1 метра при температуре 14—18°C).

Киев, тип. № 1. 1975 г. Зак. 3839—1.300.000

**ИНСТРУКЦИЯ
ПО ПОЛЬЗОВАНИЮ АПТЕЧКОЙ
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ**

ИНСТРУКЦИЯ

по пользованию аптечкой
индивидуальной

Противоболевое средство, гнездо № 1, шприц-тюбик с неокрашенным колпачком. Применять при переломах, обширных ранах и ожогах.

Правила пользования шприц-тюбиком

Извлечь из аптечки шприц-тюбик и, держа его в одной руке, другой взяться за ребристый ободок. Вращательным движением, энергично продвинуть ободок до упора, после чего снять колпачок, защищающий иглу. Не касаясь иглы руками, вколоть ее в мягкие ткани бедра в верхней трети снаружи (можно через одежду).

Сильно сжимая пальцами тюбик, выдавить содержимое и извлечь иглу, не разжимая пальцев.

Средство при отравлении ФОВ, гнездо № 2, пенал красного цвета. Принимать по 1 таблетке по сигналу гражданской обороны. При нараста-

нии признаков отравления принять еще одну таблетку.

Противобактериальное средство № 2, гнездо № 3, большой пенал без окраски. Принимать после облучения при возникновении желудочно-кишечных расстройств по 7 таблеток в один прием в первые сутки, по 4 таблетки в последующие двое суток.

Радиозащитное средство № 1, гнездо № 4, два пенала розового цвета. Принимать при угрозе облучения 6 таблеток, запивая водой. При новой угрозе облучения через 4—5 часов принять еще 6 таблеток.

Противобактериальное средство № 1, гнездо № 5, два пенала без окраски с квадратными корпусами. Принимать при угрозе или бактериальном заражении, а также при ранах и ожогах содержимое одного пенала (5 таблеток), запивая водой. Содержимое второго пенала (5 таблеток) принять через 6 часов.

Радиозащитное средство № 2, гнездо № 6, пенал белого цвета. Принимать по 1 таблетке ежедневно в течение 10 дней после выпадения радио-