



ПОКАЗАНИЯ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ:

100 мл препарату містять:

Бутафосфан – 10 г

Ціанкобаламін – 0,005 г

- Катозал применяют для животных и птицы с целью:
- профилактики и лечения нарушений обмена веществ, вызванных несбалансированным кормлением, плохим содержанием или различными заболеваниями.
- профилактики бесплодия и послеродовых осложнений;
- лечение вторичных анемий и анемий при гельминтозах;
- стимулирование роста молодняка животных и повышение резистентности их организма к разным заболеваниям.
- Повышение продуктивности, выносливости, работоспособности животных при истощении и перенагрузке.
- Повышение мышечной активности у коней за 2 – 3 дня до соревнований;
- Профилактика каннибализма и расклева у птицы, а также сокращение пери ода линьки и увеличение периода яйцекладки.



Преимущества Катозала:

- Больше 50 лет использования в мире;
- Наибольшее количество показаний к применению;
- Катозал применяется в виде внутривенных, внутримышечных и подкожных инъекций.
- ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: отсутствуют.
- ПОБОЧНЫЕ ЯВЛЕНИЯ: отсутствуют.
- ПЕРИОД ОЖИДАНИЯ: использование мяса, молока и яиц в еду без ограничений.
- Срок годности :5 лет
- Любимый препарат ветеринаров!

ПОКАЗАНИЯ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ:



Байкокс5% - суспензия для лечения и профилактики кокцидиоза поросят и телят, имеет в своем составе 50мг/мл толтразурила, вещество, которое имеет уникальные кокцидиоцидные свойства.

Действует на всех стадиях развития кокцидий

Защищает слизистую оболочку кишечника от разрушительного влияния кокцидий

Сохраняет кишечник целостным и здоровым, что в свою очередь обеспечивает высокий уровень иммунной защиты.

В результате:

- Повышаются привесы,
- уменьшается проявление секундарной (вторичной) инфекции,
- Экономия расходов на ветеринарные препараты,
- Уменьшение количество поносов в раннем возрасте
- Улучшаются показатели конверсии корма.

Преимущества препарата Байкокс 5%

Кокцидиоцидное действие, благодаря которой удается разорвать цикл развития кокцидий.

Эффективное действие на все внутриклеточные стадии развития кокцидий в тонком и толстом отделе кишечника.

Содействие формированию собственного иммунитета
животного против кокцидиоза.

Удобно применять: однократное введение, оральное применение.

Безопасность, совместимость со всеми препаратами, также и с вакцинами.

Байкокс 5% появился в Украине в 2004 году, с этого момента препарат используют 70% промышленных свиноводческих хозяйств.

Показание к применению:

Байкокс обладает кокцидицидным действием.

В 1 л Байкокса 2,5% содержит 25 г толтразурила.

Применяют для:

- бройлеров и ремонтного молодняка кур;
- индюков;
- гусей и уток.



Преимущества Байкокс 2,5%

- Оказывает немедленное действие на эймерий,
- эффективно действует на все внутриклеточные стадии их развития,
- эффективен против всех видов кокцидий и всех резистентных штаммов.
- Байкокс не препятствует выработке иммунитета против кокцидиоза,
- обладает хорошей переносимостью даже при 10-кратном превышении дозы,
- совместим с кормовыми добавками, витаминами и лечебными препаратами для птиц.

Показания к применению:

Высокоэффективный препарат для борьбы с гельминтами, эндо и экто паразитами у КРС, овец и свиней.

Препарат применяют однократно в следующих дозах:
крупному рогатому скоту, овцам и оленям — 1 мл баймека на 50 кг веса животного, свиньям — 1 мл баймека на 33 кг веса животного.

Лечение и профилактика
нематодозов желудочно-кишечного тракта,
гельминтов дыхательных путей,
гиподерматоза,
чесотки и вшивости у животных.



Преимущества Баймек 1%

- после подкожного введения препарат быстро всасывается в месте введения, распространяется в органы и ткани животного, обеспечивая длительное противопаразитарное действие.
- ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: отсутствуют.
- ПОБОЧНЫЕ ЯВЛЕНИЯ: отсутствуют.
- ПЕРЕДОЗИРОВКА: отсутствует.
- Однократное введение препарата.

Показание к применению:

шприц-катетер 4,5 г — суспензия для лечения маститов у сухостойных коров.

Клоксациллин, входящий в состав препарата, обладает широким спектром бактерицидного действия.

Байоклокс® DC» применяют при одномоментном запуске коров для профилактики мастита бактериальной этиологии у коров в сухостойный период.

Преимущества:

Побочные действия: отсутствуют.

Передозировка: отсутствует.



Показание к применению:



Лактобой – антибактериальное лекарственное средство в форме суспензии, содержащее в качестве действующих веществ 1,5% ампициллина натриевой соли и 4% клоксацилина натриевой соли,.

Назначают для лечения мастита бактериальной этиологии у коров в период лактации.

Преимущества:

Противопоказания: отсутствуют.

Побочные действия: отсутствуют.

Показание к применению:



Мультибай® IMM - препарат для лечения коров, больных маститом бактериальной этиологии в период лактации.

в качестве действующих веществ:
бензилпенициллина прокаин - 100 мг,
стрептомицина сульфат - 100 мг,
неомицина сульфат - 100 мг
преднизолон - 10 мг.

Преимущества:

-Мультибай® IMM относится к малоопасным веществам, не оказывает местнораздражающего действия на ткани молочной железы.

Противопоказания: отсутствуют.

Побочные действия: отсутствуют.

Передозировка: не выявлено.

Показания к применению:



Байоклав IMM LC — антибактериальное лекарственное средство в форме суспензии, содержащее в качестве действующих веществ:

200 мг амоксициллина (в форме амоксициллина тригидрата),
55 мг клавулановой кислоты (в форме кальция клавуланата),
10 мг преднизолона.

назначают для лечения мастита бактериальной этиологии у коров в период лактации.

Преимущества:

Противопоказания: отсутствуют.

Побочные действия: не выявлено.

Показание к применению:

защита КРС от нападений мух, слепней, вшей, власоедов и других кровососущих насекомых

Действующее вещество: 1% цифлутрин.

Преимущества:

После обработки препаратом Байофлай® Пур-он у скота:

увеличиваются приросты;

увеличивается молочная продуктивность;

болезни, которые переносятся насекомыми значительно уменьшаются, или вообще не наблюдается.

Сроки ожидания: молоко – 0 дней,

мясо – 0 дней.



Показание к применению:



раствор для орального применения

Антимикробный препарат широкого спектра действия для лечения инфекционных заболеваний домашней птицы. Эффективен относительно грамположительных и грамотрицательных бактерий и микоплазм.

Состав: В 1 мл раствора содержится 100 мг энрофлоксацина.

ЭФФЕКТИВНЫЙ В ОТНОШЕНИИ ГРАМПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ И ГРАМОТРИЦАТЕЛЬНЫХ БАКТЕРИЙ, МИКОПЛАЗМ.

Показание к применению:

Байтрил® 5% раствор для инъекций при болезнях бактериальной и микоплазменной этиологии у телят, свиней.

Действующее вещество: энрофлоксацин.

Преимущества:

- При инъекции быстро всасывается и проникает в большинство органов и тканей,
- Не проявляет иммуносупрессивного действия,
- Не вызывает аллергии,
- не токсичный.



Показание к применению:



Препарат с высокой акарицидной и инсектицидной эффективностью.
Для уничтожения чесоточных клещей (Psoroptes, Sarcoptes, Chorioptes),
кусающих и сосущих вшей, рунцов овечьих, блох, а также личинок мясной мухи.

Состав: 100 мл содержат 50 г фоксима.

Обработка овец, нелактующего крупного рогатого скота и свиней
производится методом опрыскивания или обмывания.

Преимущества:

Себацил® 50% характеризуется высокой акарицидной и инсектицидной
эффективностью одновременно с низкой токсичностью для млекопитающих.

Калифорнийский маститный тест

Водянистая жидкость фиолетового цвета.

Состав:

Соль сорбиновой кислоты; натрий алкано-сульфат; бромкрезоловая фиолетовая натриевая соль; вода

Применение:

Калифорнийский маститный тест (КМТ) применяют для быстрой оценки количества соматических клеток в молоке. КМТ также может быть использован для проверки соматических клеток в молоке после лечения мастита.

Форма выпуска:

Пластиковые бутылки объемом 1000 мл.