

07.07.2020

Окситоцин
(розчин для ін'єкцій)
листівка-вкладка

Опис

Прозорий безбарвний розчин.

Склад

1 мл препарату містить:

синтетичного окситоцину – 10 ОД.

Допоміжні речовини: хлорбутанолгідрат, спирт етиловий, кислота оцтова, вода високоочищена.

Фармакологічні властивості

АТС vet класифікаційний код: QH01BB02 - Окситоцин.

Окситоцин – гормон задньої долі гіпофізу білково-пептидної структури. Виявляє стимулюючу дію на гладеньку мускулатуру матки, підвищує скорочувальну активність і в меншій мірі тонус матки.

Застосування

Самкам свійських тварин (корови, кобили, вівці, кози, свиноматки, суки, кішки) при: затяжних пологах (гіпотонія, атонія матки); післяродових маткових кровотечах; затримці посліду; для стимуляції процесів післяродового самоочищення матки; в комбінації з іншими хіміотерапевтичними засобами – для терапії ендометритів; свиноматкам для лікування агалакції і покращення виділення молока.

Дозування

Підшкірно або внутрішньом'язово, одноразово в дозах (ОД):

корови, кобили – 30-60;

вівці, кози – 10-15;

свиноматки – 20-30;

суки – 5-10;

кішки – 2-3.

При необхідності пришвидшення дії, можливе внутрішньовенне введення разом з розчином глюкози. При цьому дозу окситоцину зменшують на 30%.

Протипоказання

Не встановлені.

Застереження

Не застосовувати при слабо розкритій шийці матки або неправильному положенні плоду. Окситоцин викликає посилення скорочення міометрію. Матка у вагітних самок чутлива до препарату більше, ніж не вагітних. Ефект окситоцину підвищується зі збільшенням терміну вагітності і досягає максимуму під час пологів. Висока чутливість зберігається ще кілька днів після пологів.

Окситоцин впливає також на секрецію молока (підвищує вивільнення лактогенного гормону передньої долі гіпофізу) і його виділення (за рахунок збудження міоепітеліальних елементів молочної залози).

Розчин окситоцину можна застосовувати разом з багатьма часто використовуваними розчинами для внутрішньовенного введення і наступними препаратами: нетилміцину сульфатом, натрію бікарбонатом, тетрацикліну гідрохлоридом, тіопенталом натрію, верапамілу гідрохлоридом.

Окситоцин не сумісний з такими препаратами, як фібринолізин, норадреналін, метеразин, варфарин натрію.

Форма випуску

Скляні ампули по 2; 5; 10 мл; скляні флакони по 5; 10; 20; 50; 100 та 200 мл.

Зберігання

Захищене від світла, прохолодне місце або холодильник, при температурі від 3 до 12°C. Не допускати замороження. Транспортування (до 3-х діб) допускається при температурі до 25°C.

07.07.2020

Термін придатності
2 роки.

Для застосування у ветеринарній медицині!

Власник реєстраційного посвідчення та виробник
ТОВ "БРОВАФАРМА"

м. Бровари, б-р Незалежності 18-а, Київської обл., 07400

КОНТРОЛЬОВАНИЙ
ПРИМІРНИК № 1