

Dentalex-12

Герметик стоматологічний світлотверднучий

Призначення

Dentalex-12 призначений до застосування у дитячій терапевтичній стоматології, як засіб профілактики каріесу. Герметик застосовується для барernoї герметизації фісур та пломбування в початковій стадії каріесу.

Властивості

Dentalex-12 відноситься до групи малонаповнених текучих композитів, має покращену адгезію та зносостійкість.

Герметик Dentalex-12 має високу технологічність, що дозволяє застосовувати його в умовах клініки та шкільних стоматологічних кабінетів. Dentalex-12 твердне при кімнатній температурі протягом 30 с за допомогою стоматологічного фотополімерізатора. Затверділа поверхня стіка до чищення зубною щіткою.

Способ застосування

Підготовка зубної емалі

Перед тим, як нанести герметик, зуби старанно очищують зубною пастою. Після чого промивають та висушують зуби. Витискають зі шприца через канюлю необхідну кількість труючого гелю у кювету або на скляну пластину. Потім пензликом наносять на жувальну поверхню, що буде герметизуватися. Можна наносити гель безпосередньо на поверхню зубу, що оброблюється. Витримують гель на емалі 30с. Протрусуну поверхню промивають водою зі стоматологічної установки (тампонами не користуватись!) та висушують стисненим повітрям. Правильно протруена поверхня емалі повинна мати тъмяний крейдяний вигляд. Канюлю після використання промивають водою за допомогою шприца.

Аплікація герметика

Видавлюють зі шприца через канюлю

невелику кількість пасті Dentalex-12 на фісуру, що буде герметизуватися, та за допомогою стоматологічного зонду заповнюють фісуру та заглиблення герметиком. При наявності надлишку пасті приирають її ватною кулькою, трохи промокаючи поверхню зубу.

Твердиння пасті Dentalex-12 необхідно здійснювати стоматологічним фотополімерізатором, що має потужність лампи не менш, як 50 Вт та довжину хвилі у діапазоні 400-500 нм. Час твердиння кожної аплікації 30 с.

Після твердиння дають витримку протягом 1 хвилини після чого приирають з поверхні зубів липкий шар ватною кулькою.

Рекомендації

Щоб запобігти передчасному твердиння герметика відразу після відбору пасті закрити шприц ковпачком.

При тривалому зберіганні труючого гелю можливе його загуснення. Для отримання необхідної консистенції треба відавити гель на скло та трохи перемішати.

Умови зберігання

Dentalex-12 в упакованому вигляді повинен зберігатися в закритих прохолодних приміщеннях, захищених від впливу атмосферних опадів, прямих сонячних променів і на відстані не менш, як 1 м від опалювальних пристрій.



ПП "Латус",
61010, м.Харків,
вул. Текстильна, 82,
Тел. +380577332697
www.latus.com.ua



UA.TR.002

Dentalex-12

Герметик стоматологический светоотверждаемый

Назначение

Dentalex-12 предназначен к применению в детской терапевтической стоматологии, как средство профилактики кариеса. Герметик применяется для барьевой герметизации фиссур и пломбирования в начальной стадии кариеса.

Свойства

Dentalex-12 относится к группе малонаполненных текучих композитов, обладает повышенной твердостью и износостойкостью.

Герметик Dentalex-12 обладает высокой технологичностью, позволяющей применять его в условиях клиники и школьных стоматологических кабинетов. Dentalex-12 отверждается при комнатной температуре в течение 30 с при помощи стоматологического фотополимеризатора. Отверженная поверхность устойчива к чистке зубной щеткой.

Способ применения

Подготовка эмали зуба

Перед тем, как нанести герметик, зубы тщательно очищают зубной пастой. После чего промывают и высушивают зубы. Выдавливают из шприца через канюлю необходимое количество травильного геля в кювету или на стеклянную пластину. Затем кисточкой наносят на жевательную поверхность, подлежащую герметизации. Можно наносить гель непосредственно на обрабатываемую поверхность зуба. Выдерживают гель на эмали 30 с. Протравленную поверхность промывают водой из стоматологической установки (тампоны не применять!) и высушивают сжатым воздухом. Правильно протравленная поверхность эмали должна иметь тусклый меловой вид. Канюлю после использования промывают водой при помощи шприца.

Аппликация герметика

Выдавливают из шприца через канюлю небольшое количество пасты Dentalex-12 на герметизируемую фиссиру и при помощи стоматологического зонда заполняют фиссиру и углубления герметиком. При наличии излишков пасты аккуратно удаляют ее ватным шариком, слегка промокая поверхность зуба.

Отверждать пасту Dentalex-12 необходимо стоматологическим фотополимеризатором, имеющим мощность лампы не менее 50 Вт и длину волн в диапазоне 400 - 500 нм. Время отверждения каждой аппликации 30 с.

После отверждения дают выдержку около 1 мин, а затем ватным шариком удаляют с поверхности зубов липкий слой.

Рекомендации

Во избежание самополимеризации герметика сразу после отбора пасты закрыть шприц колпачком.

При длительном хранении травильного геля возможно его загустевание. Для получения необходимой консистенции выдавите гель на стекло и немножко перемешайте.

Условия хранения

Dentalex-12 в упакованном виде должен храниться в закрытых прохладных помещениях, защищенных от воздействия атмосферных осадков, прямых солнечных лучей и на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов.



ЧП "Латус",
61010, г.Харьков,
ул. Текстильная, 82,
Тел. +380577332697
www.latus.com.ua

