МАКСИМАЛЬНІ ПОКАЗНИКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРИ ОПТИМАЛЬНИХ ВИТРАТАХ КОРМУ

100% НАТУРАЛЬНИЙ ПРОДУКТ З ЕКОЛОГІЧНО ЧИСТИХ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ

НЕ МІСТИТЬ ГОРМОНІВ РОСТУ ТА АНТИБІОТИКІВ

Свинарство *– специфічна галузь тваринництва. Біологія розвитку, годівля, утримання і догляд потребує високих матеріальних затрат, а їх економія залежить від суворого дотримання науково-обгрунтованих підходів до організації ведення галузі. Здорові поросята з відмінною генетикою становлять 30-40% успіху свинарства. Другим, важливим фактором ефективного вирощування поросят є створення максимально комфортних умов для утримання. Третім, надважливим елементом успішного ведення господарства залишається годівля.*

Приміщення

Приміщення для утримання поросят має забезпечувати дотримання параметрів мікроклімату та санітарних норм упродовж року. Можна обирати приміщення з вигульною площадкою, оскільки під час прогулянок тварини зміцнюють імунітет, а свіже повітря благоприємно сприяє приросту маси тала.

Вибір молодняку

Поросят краще купувати в перевірених продавців або в спеціалізованих господарствах. Під час вибору тварин необхідно звертати увагу на вгодованість, бадьорий темперамент, гладеньку еластичну шкіру, достатній розвиток шовкової щетини, сухий і чистий хвіст. Пряма або злегка випукла спина, широкі та глибокі груди, міцні, добре поставлені кінцівки з блискучим чистим копитним рогом свідчать про клінічно здорову тварину. Необхідно звертати увагу на стан легень: у здорових поросят дихання глибоке, без хрипів та кашлю. Нормально розвиненим вважається порося якщо в 3-4 тижні вага становить 5-7 кг, а в 7-8 тижнів – 14-18 кг.

Відлучення *- це комплекс технологічних операцій, направлених на максимальне зниження наслідків стресу у молодняка, збереження у нього високої енергії росту та підготовка свиноматки до наступного репродуктивного циклу.*

НОРМАТИВНІ ПОКАЗНИКИ ПРИ ВИРОЩУВАННІ ПОРОСЯТ

Показники	Супоросні свиноматки	Лактуючі свиноматки	Поросята, днів			
			5-42	43-77	78-125	126-190
Температура повітря, °С	17-18	18-20	30-28*	26-22	18-20	18-20
Тривалість освітлення, годин	12-14	14-18	14-18	8-16	8-12	8-12
Площа, м²/гол.	2,2-2,5	5,0-7,0	0,35-0,41	0,35-0,41	0,8-1,0	0,8-1,2
Фронт годівлі, см/гол.	0,4-0,5	0,4-0,5	0,20-0,25	0,2-0,3	0,3	0,4
Фронт напування, см/гол.	0,4-0,5	0,4-0,5	0,20-0,25	0,2-0,3	0,3-0,4	0,4-0,4

ПРЕСТАРТОВИЙ ПЕРІОД (0-42 ДНІВ)

Не пізніше 1 години від народження порося повинно отримати першу порцію молозива. З 2-3 доби настає необхідність поросят у чистій питній воді. З 5-7 доби облаштовують годівниці, в які насипається комбікорм (ВМ ПК S 8393). Раннє введення корму дозволяє ферментній системі поросят своєчасно перелаштуватись з молочної годівлі на рослинний комбікорм, що полегшує процес відлучення і забезпечує успішне вирощування поросят, за рахунок прискореного розвитку системи травлення. Престартер згодовують вволю. ВМ ПК S 8393 - оптимально збалансований за складом та поживністю, забезпечує поросят усіма поживними речовинами, які необхідні для інтенсивного розвитку та росту поросят.

Основною умовою успішного розвитку у період після відлучення є правильна підготовка до годівлі твердими кормами рослинного походження. Дуже важливо максимально

СТАРТОВИЙ ПЕРІОД (43-77 ДНІВ)

З 43 по 77 добу поросятам необхідно згодовувати повноцінний стартовий комбікорм ВМ ПК S 8397 к. При сухому типі годівлі витрачається значно менше коштів на догляд. Поросята ростуть швидше, а навоз не має різко вираженого запаху. Використання комбікорму забезпечує стабільний розвиток травної системи, що надзвичайно важливо для високої продуктивності та економічного ефекту.

ВІДГОДІВЕЛЬНИЙ ПЕРІОД (78-190 ДНІВ)

Дуже важливим є режим годівлі, оскільки передчасно виданий корм з'їдається без апетиту, а при його затримці тварини непокояться, внаслідок чого знижуються прирости. Важливо спілкуватися під час годівлі з тваринами спокійно та ласкаво. В останні два місяці перед забоєм прогулянки тварин необхідно припинити, а інтенсивність освітлення необхідно знижувати. Період відгодівлі свиней триває від 78 по 190 добу, розділений на два періоди: гроверний - з 78 по 125 добу з використанням комбікорму ВМ ПК S 8398 г та фінішний з використанням комбікорму ВМ ПК S 8399 г з 126 по 190 добу. Головним фактором при відгодівлі поросят є постійний цілодобовий доступ до корму та води.

ОРІЄНТОВАНІ ПОКАЗНИКИ ПРИ ВИРОЩУВАННІ ПОРОСЯТ

Комбікорм / Показники	Супоросні свиноматки	Лактуючі свиноматки	Вік поросят, днів			
			5-42	43-77	78-125	126-190
	ВМ ПК S 8395г для супоросних свиноматок та ремонтного молодняку (гранула)	ВМ ПК S 8396г для лактуючих свиноматок (гранула)	ВМ ПК S 8393 престарт (гранула)	ВМ ПК S 8397к старт (крупка)	ВМ ПК S 8398г гровер (гранула)	ВМ ПК S 8399г фініш (гранула)
Середньодобове споживання корму, кг/гол.	2,5-3,0	6,5-8,5	0,27	1,25	2,44	3,1
Споживання корму за весь період годівлі, кг	230-280	200-210	10	55	115	199
Вага на кінець періоду, кг	в залежності від віку	в залежності від віку	10	35	65	110-120

Доцільність використання готових комбікормів промислового виробництва пояснюється багатьма факторами, зокрема, всі компоненти представлені в доступній для засвоєння формі та в ідеальному співвідношенні. Білкові інгредієнти представлені у вигляді оброблених концентратів, що також забезпечує легкодоступність і перетравність.

ВИГОТОВЛЕНО НА ВИСОКОТЕХНОЛОГІЧНОМУ ЄВРОПЕЙСЬКОМУ ОБЛАДНАННІ

СПРИЯЄ СКОРОЧЕННЮ ПЕРІОДУ ВІДГОДІВЛІ ТА ЗБІЛЬШЕННЮ ПРИБУТКУ

ЗРУЧНА РОЗГАЛУЖЕНА ЛОГІСТИКА ТА СКЛАДИ В КОЖНОМУ РЕГІОНІ УКРАЇНИ ТА СИСТЕМА СЕРТИФІКАЦІЇ

ВМІСТ ВІТАМІНІВ, МІКРОЕЛЕМЕНТІВ ТА ПОКАЗНИКИ ПОЖИВНОСТІ КОМБІКОРМІВ

Артикул	Нетто енергія, кКал	Сирий протеїн, %	Ca, %	Лізин, %	P(засв.), %
ВМ ПК S 8395г для супоросних свиноматок та ремонтного молодняку (гранула)	2200,00	14,00	0,75	0,79	0,45
ВМ ПК S 8396г для лактуючих свиноматок (гранула)	2250,00	16,00	0,95	0,86	0,55
ВМ ПК S 8393 престарт (гранула)	2380,00	18,50	0,55	1,35	0,48
ВМ ПК S 8397к старт (крупка)	2300,00	16,50	0,75	1,03	0,50
ВМ ПК S 8398г гровер (гранула)	2250,00	15,00	0,70	0,92	0,48
ВМ ПК S 8399г фініш (гранула)	2200,00	14,00	0,60	0,77	0,42

В складі комбікорму містяться органічні кислоти, що пригнічують розвиток патогенної мікрофлори, активізують роботу ферментів, а легкодоступні мінеральні компоненти, зокрема монокальційфосфат, практично не зв'язують їх, тому покращують обмін речовин і повністю використовують потенціал тварин. Фітаза підвищує використання фосфору. Спеціальний комплекс лімітуючих амінокислот оптимізує їх склад в кормі, таким чином утворюється ідеальний протеїн. В склад також входять комплекси пробіотиків, дріжджів та ензимів, що сприяють гарному травленню, абсорбції поживних речовин, що благоприємно впливає на здоров'я тварин.

Виготовлено в Україні. З питань придбання звертатись: ТОВ **«Українське зерно»**
м. Полтава,вул. М.Бірюзова, 32а

(0532) 506-328 (528)
(0532) 610-026 (027)

office_pl@ie.net.ua

www.kombikorm.org
www.ukrainske-zerno.com