

**МАКСИМАЛЬНІ ПОКАЗНИКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРИ ОПТИМАЛЬНИХ ВИТРАТАХ КОРМУ**

**100% НАТУРАЛЬНИЙ ПРОДУКТ З ЕКОЛОГІЧНО ЧИСТИХ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ**

**НЕ МІСТИТЬ ГОРМОНІВ РОСТУ ТА АНТИБІОТИКІВ**



## СТАРТОВИЙ ПЕРІОД ВІДГОДІВЛІ (0-55 ДІБ)

### Приміщення

Для вирощування індиків обирають ізольоване приміщення. Не бажано розміщувати птахів різних вікових груп у одному приміщенні, оскільки це сприяє передачі збудників захворювань через обслуговуючий персонал.

Перед посадкою птиці необхідно підготувати приміщення: видалити послид, провести сухе прибирання (підмітання), з допомогою пристрою для мийки під високим тиском провести вологе прибирання, ретельно очистити годівниці і поїлки.



Після висушування завозять підстилку (стружку дерева, торф, солому, лушпиння соняшника) контролюючи її якість: небезпечно використовувати запилений, запліснявілий або вологий матеріал зі шкідниками. За необхідності приміщення прогрівають за 2-4 дні.

### НОРМАТИВНІ ПОКАЗНИКИ ПРИ ВИРОЩУВАННІ ІНДИКІВ

Показники	Вік птиці, днів		
	0-7	7-28	28-115
Температура повітря, °C	37-33	32-24	22-20
Тривалість освітлення, годин	24-18	18-14	14
Відносна вологість, %	60-70	60-70	60-70
Щільність посадки, гол./м <sup>2</sup>	5-8	4-5	2-3
Фронт годівлі, см/гол.	2-3	3-5	8-12
Фронт напування, см/гол.	1,3-2,0	2,0-3,0	3,0-4,0



Параметри мікроклімату контролюють упродовж усього періоду вирощування.

### Вибір молодняку

За якість і продуктивність птиці відповідає в першу чергу постачальник. Для відгодівлі бажано обирати індичат вагою не нижче 50 г з розвиненим пухом та блискучими очима, без ознак виділень та забруднень. Індичата повинні швидко реагувати на появу шуму в приміщенні.

Добовий молодняк ніжно викладають із коробок, бажано обмежити їх простір огорожею або спеціальними кільцями з металевих сіток чи іншого перфорованого матеріалу (створити ринг). Після цього індичат треба залишити самих у спокої хвилин на 30. Годівниці й напувалки максимально наповнюють і розміщують в добре освітлюваних місцях. Ринги розпускають на 4 – 6 день, при цьому береться до уваги стан птиці та температура оточуючого середовища.



## ПЛАНОВІ ПОКАЗНИКИ ВИРОЩУВАННЯ ІНДИКІВ

### Нормативні показники

Вік тварини, птиці (дні)  
Середньодобове споживання корму, г/гол.  
Споживання корму за весь період годівлі, кг  
Вага на кінець періоду, кг

ВМ ПК Т 8501 к старт (крупка)	ВМ ПК Т 8502 г гровер (гранула)	ВМ ПК Т 8503 к фініш (гранула)
0-55	56-90	з 91
175	455	580
10	16	22
4,9-5	9-10	14,5-15,5

Молодняк індиків, особливо племінного призначення, вирізняється високою вимогливістю до годівлі. Для нього потрібні легкозасвоювані, доброякісні різноманітні кормові компоненти з невисоким вмістом клітковини. У числі кормових факторів, що визначають життєздатність та продуктивні якості птиці, протеїнове харчування посідає одне з провідних місць. Це завдання вирішує повнораціонний збалансований комбікорм ТМ «BestMix» ВМ ПК Т 8501к, що характеризується максимальною концентрацією сирого протеїну та незамінних амінокислот.



### Годівля

Визначити, чи наїлося індича, дуже просто: треба помацати зобик після годування – у голодних він порожній або трохи заповнений. Якщо таких індичат виявиться багато, треба вжити негайних заходів: відсадити слабких, переглянути щільність посадки, додати годівниць, підсунути ближче годівниці до світла і т.п.

Індичата погано переживають різку зміну кормів. Виходячи з цього, кожний новий вид корму вводять поступово. І бажано не ввечері, а краще робити це зранку, щоб впродовж дня у молодняку було більше часу пристосуватися до такого «стресового» фактору.

Власники повинні спостерігати за зміною споживання корму і води, скупченням у кутках і відокремлення від стада, зміною запаху в пташнику, кольору або консистенції посліду, появою раптових змін у поведінці та зовнішнього вигляду (втягування шиї, настовбурчення пір'я, посилення дихання з відкритим дзьобом, жалібний писк, незвичні звуки дихання, поїдання підстилки, блідий або темний колір шкіри голови).



## РОСТОВИЙ ПЕРІОД (18-43 ДНІВ)

Повноцінне білкове живлення в перші 8 тижнів життя є визначальним для реалізації потенційних можливостей росту, розвитку та подальшої продуктивності, становлення ряду важливих фізіологічних функцій, природної резистентності організму. Згодовування повнораціонного комбікорму ВМ ПК Т 8502г забезпечує повний прояв генетичного потенціалу продуктивності птиці. Ретельно підібрані білкові компоненти ростового комбікорму сприяють інтенсивному розвитку м'язових волокон особливо грудної частини.

**ВИГОТОВЛЕНО НА ВИСОКОТЕХНОЛОГІЧНОМУ ЄВРОПЕЙСЬКОМУ ОБЛАДНАННІ**

**СПРИЯЄ СКОРОЧЕННЮ ПЕРІОДУ ВІДГОДІВЛІ ТА ЗБІЛЬШЕННЮ ПРИБУТКУ**

**ЗРУЧНА РОЗГАЛУЖЕНА ЛОГІСТИКА ТА СКЛАДИ В КОЖНОМУ РЕГІОНІ УКРАЇНИ ТА СИСТЕМА СЕРТИФІКАЦІЇ**



**ВМІСТ ВІТАМІНІВ, МІКРОЕЛЕМЕНТІВ ТА ПОКАЗНИКИ ПОЖИВНОСТІ КОМБІКОРМІВ**

Артикул	Обмінна енергія, кКал	Сирий протеїн, %	Са, %	Лізин, %	Р(засв.), %
ВМ ПК Т 8501 к старт (крупка)	2850,00	27,50	1,45	1,79	0,85
ВМ ПК В 8502 к гровер (гранула)	2950,00	21,00	1,25	1,48	0,75
ВМ ПК Т 8503 к фініш (гранула)	3050,00	18,00	1,00	0,17	0,65



### Фінішний період (від 91 дня)

У заключний період відгодівлі індиків використовують фінішний комбікорм ВМ ПК Т 8503г. Особливо важливим є використання цього корму для розвитку органів системи розмноження при збереженні батьківського поголів'я. Зміну раціонів необхідно проводити поступово упродовж 2-3 діб.

Виготовлено в Україні. З питань придбання звертатись: ТОВ «Українське зерно» м. Полтава, вул. М.Бірюзова, 32а

(0532) 506-328 (528)  
(0532) 610-026 (027)  
office\_pl@ie.net.ua  
www.kombikorm.org  
www.ukrainske-zerno.com

