Додаток 2
до реєстраційного посвідчення АВ-00576-01-09
від 01.04.2020 р.

Бровальзен таблетки
(таблетки)
листівка–вкладка

Опис

Плоскі циліндричні таблетки від білого до сірувато-білого кольору (масою 1 г) або продовгувато-овальні (масою 0,5 та 5,0 г).

Склад

1 г препарату містить діючу речовину:

альбендазол - 75,0 мг.

Допоміжні речовини: лактоза, кальцію карбонат, глюкоза, крохмаль, тальк, кальцію стеарат.

Фармакологічні властивості

ATCvet, антигельмінтні ветеринарні препарати (QP52AC11, альбендазол)

Альбендазол належить до групи бензимідазолів, які гальмують білковий (тубулярний) синтез, у результаті чого порушується надходження і внутрішньоклітинне транспортування поживних речовин, обмін субстратів речовин (аденозинтрифосфорної кислоти і глюкози), а також знижуються мітохондріальні реакції, шляхом гальмування фумаратредуктази, що викликає загибель паразитів.

Альбендазол – антигельмінтик широкого спектру дії, ефективний проти молодих і статевозрілих нематод та деяких личинкових форм, які паразитують у травному тракті та дихальних шляхах тварин; преімагінальних та імагінальних стадіях цестод; статевозрілих трематод.

Застосування

Дегельмінтизація великої рогатої худоби, овець, кіз, коней, собак, котів, хутрових звірів при ураженні нематодами, цестодами, трематодами:

велика рогата худоба – нематодозах травного каналу і дихальних шляхів: *Haemonchus placei; Bunostomum phlebotomum; Oesophagostomum spp.; Trichostrongylus spp.; Ostertagia spp.; Cooperia oncophora; Chabertia spp.; Neoascaris vitulorum; Strongyloides papillosus; Dictyocaulus viviparus; Muellerius spp.; Protostrongylus spp.;*

цестодозах: *Moniezia spp.; Thysaniesia giardia;*

трематодозах: *Fasciola hepatica (статевозрілі); Dicrocaelium lanceatum.*

вівці, кози – нематодозах травного каналу і дихальних шляхів: *Haemonchus contortus; Bunostomum trigonocephalum; Oesophagostomum spp.; Trichostrongylus spp.; Ostertagia spp.; Cooperia oncophora; Skrjabinema ovis; Chabertia ovina; Strongyloides papillosus; Dictyocaulus filaria; Muellerius capillaris; Protostrongylus spp.;*

цестодозах: *Moniezia spp.; Avitellina centripunctata; Thysaniesia giardia;*

трематодозах: *Fasciola hepatica (статевозрілі); Dicrocaelium lanceatum.*

коні – нематодозах травного тракту і дихальних шляхів: *Parascaris equorum, Oxyuris equi, Strongylus spp.; Triodonthophorus spp.; Cyathostomum spp.; Cylicodontophorus spp.; Cylicocyclus spp.; Strongyloides westeri; Dictyocaulus arnfieldi;*

цестодозах: *Anoplocephala magna; Anoplocephala perfoliata; Paranoplocephala mamillana.*

собаки, коти, хутрові звірі – нематодозах: *Toxocara spp., Toxascaris leonina; Ancylostoma caninum; Uncinaria spp.; Trichuris spp.;*

цестодозах: *Dipylidium caninum; Taenia spp.; Echinococcus granulosus; Diphyllobothrium latum;*

трематодозах: *Opisthorchis felineus.*

Дозування

Бровальзен таблетки задають тваринам різних видів у дозах, наведених у таблиці, одноразово до початку вранішньої годівлі у суміші з концентрованим кормом.

КОНТРОЛЬОВАНИЙ

Дози Бровальзен таблеток для тварин різних видів залежно від виду гельмінтів:

Види тварин	Види гельмінтів	Доза препарату, г/10 кг маси тіла
Велика рогата худоба	Нематоди Трематоди Цестоди	1,0 1,3-2,0 1,0
Вівці, кози	Нематоди Трематоди Цестоди	0,7 1,0 0,7
Коні та інші однокопитні	Нематоди Цестоди	0,7 0,7
Собаки, коти та хутрові звірі	Нематоди Трематоди Цестоди	3,0 3,5 3,0

Великі таблетки використовують для індивідуальної примусової дегельмінтизації дорослих жуйних тварин шляхом задавання таблетки на корінь язика.

При випасанні худоби профілактично-лікувальну дегельмінтизацію проводять на початку і вкінці стійлового періоду.

У разі потреби лікування фасціольозу жуйних тварин препарат застосовують у будь-який період року. Враховуючи, що альбендазол низько ефективний проти молодих форм фасціол, першу профілактичну дегельмінтизацію проводять через 2-2,5 місяці після закінчення пасовищного періоду, а повторну не пізніше 10-15 діб перед вигоном на пасовище. При цьому залежно від інтенсивності інвазії тварини, яку визначають за середньою кількістю яєць фасціол у 5-ти пробах фекалій, препарат застосовують у наступних дозах (г/10 кг маси тіла):

– низька інтенсивність інвазії (до 4 яєць) - 1,3 г;

- середня інтенсивність інвазії (5-10 яєць) - 1,5-1,7 г.

Протипоказання

Не застосовувати препарат самкам у першій третині вагітності, вівцематкам у період парування та впродовж місяця після виведення баранів із отари.

Застереження

Після останнього застосування препарату забій великої рогатої худоби, овець, кіз на м'ясо дозволяють через 10 діб. Використання внутрішніх органів тварин (печінка, нирки, легені, серце) в їжу дозволяють у жуйних тварин через 20 діб.

Споживання молока людям дозволяють через 2 доби після останнього застосування препарату.

Форма випуску

Флакони із полімерних матеріалів по 30, 50, 100 таблеток; блістерне пакування по 10 таблеток (масою 0,5 та 1,0 г) або по 4 таблетки (масою 5 г), по 1, 3 або 10 блістерів в картонній коробці.

Зберігання

Сухе темне місце при температурі від 0 до 30 °С.

Термін придатності

3 роки.

Для застосування у ветеринарній медицині!

Власник реєстраційного посвідчення

ТОВ "БРОВАФАРМА"

б–р Незалежності 18-а, м. Бровари, Київська обл., 07400, Україна

Виробник готового продукту

ТОВ "БРОВАФАРМА"

б–р Незалежності 18-а, м. Бровари, Київська обл., 07400, Україна

КОНТРОЛЬОВАНИЙ
ПРИМІРНИК № 1