

10.09.2021

Бровадазол 20%
(порошок для перорального застосування)
листівка-вкладка

Опис

Порошок білого кольору, зі специфічним запахом.

Склад

1 г препарату містить діючу речовину (мг):

фенбендазол – 200,0.

Допоміжна речовина: мальтодекстрин.

Фармакологічні властивості

ATCvet QP52, антигельмінтні ветеринарні препарати (ATCvet QP52AC13, фенбендазол).

Фенбендазол належить до групи бензimidазолів, має високу антигельмінтну активність і широкий спектр дії, знищує личинки зрілих нематод, деякі види цестод і трематод та їх яйця. Порушує енергетичний обмін, руйнує мікроканальці травних клітин гельмінтів і викликає у них нейротоксичний ефект. Згубно діє на личинки різних стадій та порушує цілісність оболонок яєць гельмінтів, після чого вони не здатні далі розвиватися.

Застосування

Лікування великої рогатої худоби, овець, кіз, свиней, коней, м'ясоїдних та хутрових тварин, курей, гусей при ураженні зрілими і незрілими нематодами, деякими видами цестод і трематод та їх яйцями.

Дегельмінтизація риби родини коропових за ботріоцефальозу.

Дозування

Перед застосуванням препарат змішують з кормом і дають на початку ранкової годівлі індивідуально або груповим методом.

Перед груповою дегельмінтизацією кожен партію препарату попередньо випробовують на невеликій кількості тварин, за якими спостерігають протягом доби. За відсутності ускладнень проводять масову дегельмінтизацію.

При груповому методі загальну дозу препарату збільшують на 5%.

Дози препарату для різних видів тварин та курс застосування вказані в таблиці.

<i>Вид тварини, захворювання</i>	<i>Доза, г на 10 кг маси тіла</i>	<i>Курс застосування</i>
Велика рогата худоба:		
диктіокаульоз, неоаскароз, стронгілятоз, стронгілоїдоз	0,4	одноразово
трихуроз	0,75	1 раз на добу, 2 дні
дикроцеліоз	1,0	1 раз на добу, 5 днів
цистицеркоз	1,25	1 раз на добу, 3 дні
парамфістоматидози	0,75	1 раз на добу, 5 днів
Вівці, кози:		
неоаскароз, протостронгілоз, стронгілоїдоз, трихостронгілоїдоз	0,25	одноразово
трихуроз	0,5	1 раз на добу, 2 дні
диктіокаульоз	0,5	одноразово
монієзійоз, тизанієзійоз	0,5	одноразово
ларвальні цестодози: ехінококоз, ценуроз	2,0	1 раз на добу, 3 дні
дикроцеліоз	1,0	1 раз на добу, 3 дні
Свині:		
аскароз, метастронгільоз, трихуроз	0,5	2 рази через 12 годин
езофагостомоз, олуланоз, стронгілоїдоз	0,2	2 рази через 12 годин
змішана інвазія (профілактично):		
• поросята з 2-х до 10-тижн. віку	0,05	1 раз на тиждень
• молодняк на відгодівлі	0,2	1 раз на місяць
ехінококоз	1,0	1 раз на добу, 5 днів

10.09.2021

Коні:		
параскароз	0,75	одноразово
кишкові стронгілятози	0,5	одноразово
стронгілоїдоз (лошата)	0,4	1 раз на добу, 2 дні
Собаки, коти:		
анкілостомоз, капіляріоз, теніїози, трихуроз, токсамоз, токсакароз	2,0	3 рази через 12 годин
Хутрові звірі (песці, лисиці):		
змішана нематодозна інвазія	0,75	1 раз на добу, 2 дні
Кролі:		
змішана нематодозна інвазія	0,5	1 раз на добу, 3 дні
Кури, індики:		
аскаридіоз, гетеракоз, капіляріоз	0,5	1 раз на добу, 4-5 днів
Гуси, качки:		
амідостомоз, ехінуріоз, капіляріоз, сінгамоз, стрептокарроз, тетрамероз	0,5	1 раз на добу, 4-5 днів
Риба родини коропових:		
ботріоцефальоз	1,25	1 раз на добу, 2 дні

Для дегельмінтизації риби готують лікувально-кормову суміш (ЛКС), яку рекомендується застосовувати під час вранішньої годівлі: 0,25 кг препарату ретельно перемішують з 99,75 кг комбікорму та гранулюють. Лікувальна добова доза ЛКС для водойми становить 5% від розрахункової маси риби. Добову дозу ділять на 3-4 порції й дають у місцях годівлі протягом дня через кожні 2 години, курс лікування - 2 дні. Інший корм в ці дні не дають.

Якщо раніше в господарстві для годівлі риби комбікорм не використовували, то перед дегельмінтизацією необхідно привчити рибу до комбікорму і до місць годівлі.

Протипоказання

Не застосовувати одночасно з протицестодозними препаратами, а також протягом 7 днів після лікування бромсалами.

Застереження

Після останнього застосування препарату забій великої рогатої худоби, овець, кіз, свиней на м'ясо дозволяється через 10 діб, птиці - через 3 доби. Людям вживати в їжу печінку, легені, серце тварин можна через 20 діб, молоко - через 2 доби, рибу - через 10 діб.

Форма випуску

Контейнери або пакети з полімерних матеріалів по 10, 20, 25, 100, 250, 500, 1000 г.

Зберігання

У сухому темному місці за температури від мінус 30 °С до 30 °С.

Термін придатності

3 роки.

Для застосування у ветеринарній медицині!

Власник реєстраційного посвідчення

ТОВ "БРОВАФАРМА", Україна

б-р Незалежності 18-а, м. Бровари, Київська обл., 07400

Виробник готового продукту

ТОВ "БРОВАФАРМА", Україна

б-р Незалежності 18-а, м. Бровари, Київська обл., 07400

КОНТРОЛЬОВАНИЙ
ПРИМІРНИК № 1