

**Флорон, оральний розчин**  
**(розчин для перорального застосування)**  
листівка-вкладка

**Опис**

Прозорий розчин.

**Склад**

1 мл препарату містить діючу речовину:

флуорфенікол - 100 мг.

Допоміжні речовини: пропіленгліколь.

**Фармакологічні властивості**

Флуорфенікол є похідним тіамфеніколу, в якому гідроксильна група заміщена атомом флуору, що спричинює його антибактеріальну активність проти ацетилтрансферазосинтезуючих бактерій, які є чутливими до хлорамфеніколу. Це бактеріостатичний, синтетичний засіб широкого спектру дії. Флуорфенікол пригнічує синтез білків у клітинах бактерій. У протоплазмі він зв'язується з 70S-рибосомними субодинами, в яких пригнічує ферментну активність пептидилтрансферази, і, таким чином, сповільнюючи синтез білка у рибосомах відповідних бактерій.

Флуорфенікол діє проти грампозитивних та грамнегативних бактерій, а саме *Escherichia coli*, *Pasteurella multocida*, *Salmonella spp.*, *Haemophilus spp.*, *Proteus spp.*, *Staphylococcus spp.*, *Streptococcus spp.*, *Shigella spp.*, *Klebsiella spp.*, *Enterobacter spp.*, *Actinobacillus pleuropneumoniae*, *Bordetella bronchiseptica*, *Mycoplasma hyopneumoniae*, *Mycoplasma hyorhinis*, *Salmonella choleraesuis*, *Streptococcus suis* та ін.

**Застосування**

Кури (кури-бройлери, племінні кури, ремонтний молодняк птиці): лікування птиці, хворої на колі-інфекцію, стафілококову інфекцію, пастерельоз, а також при захворюваннях органів дихання, що спричинені мікроорганізмами, чутливими до флуорфеніколу.

Свині: лікування тварин, хворих на плевропневмонію, атрофічний риніт, хворобу Гласера, а також при інших захворюваннях органів дихання, що спричинені мікроорганізмами, чутливими до флуорфеніколу.

**Дозування**

Перорально з питною водою у дозі:

кури (кури-бройлери, племінні кури, ремонтний молодняк птиці): для курчат віком до 4-х тижнів - 20 мг флуорфеніколу на кг маси тіла, або 100 мл препарату на 100 л питної води щодобово; для курей віком старше 4-х тижнів - 200 мл препарату на 100 л питної води щодобово. Курс лікування - 3-5 днів.

свині - 1,5-2 мг флуорфеніколу на кг маси тіла, що відповідає 1,5-2 мл на 100 кг маси тіла тварини щодобово протягом 7 днів.

Протягом лікування тваринам дають воду тільки з препаратом. Не слід давати тваринам будь-яку іншу воду для випоювання. Якщо це неможливо, щодобова доза має бути розділена на два прийоми: першу половину дози препарату задають вранці, другу - через 12 годин.

**Протипоказання**

Не застосовувати тваринам з підвищеною чутливістю до флуорфеніколу.

Не застосовувати курам-несучкам, яйця яких призначені в їжу людям, а також супороносним свиноматкам та у період лактації. Не застосовувати одночасно з тіамфеніколом або хлорамфеніколом. Препарат не слід застосовувати дорослим кнурам, призначеним для репродукції.

**Застереження**

Забій тварин та птиці на м'ясо дозволяється через 2 доби (птиця) та 1 добу (свині) після останнього застосування препарату. Отримане, до зазначеного терміну, м'ясо утилізують або згодовують непродуктивним тваринам, залежно від висновку лікаря ветеринарної медицини.

При перемішуванні препарату у питній воді у концентрації вищій 1 г флуорфеніколу на 1 літр питної води, активна речовина може випасти в осад.

**Форма випуску**

Флакони з темного скла по 100 мл.

Пластикові флакони по 1000 мл з нанесенням виміру.

**Зберігання**

Сухе темне, недоступне для дітей місце за температури від 5<sup>0</sup>С до 30<sup>0</sup> С.

Термін придатності -2 роки.

Після відкриття заводського упакування термін придатності становить 28 діб за умов зберігання за температури від 5<sup>0</sup>С до 25<sup>0</sup> С.

**Для застосування у ветеринарній медицині!**

**Власник реєстраційного посвідчення**

КРКА, д.д., Ново место

Шмар'єшка цеста 6,

8501 Ново место,

Словенія.

KRKA, d.d., Novo mesto, Slovenia

Šmarješka cesta 6,

8501 Novo mesto,

Slovenia

**Виробник готового продукту**

КРКА, д.д., Ново место

Шмар'єшка цеста 6,

8501 Ново место,

Словенія.

KRKA, d.d., Novo mesto, Slovenia

Šmarješka cesta 6,

8501 Novo mesto,

Slovenia