

ДЕЗИРЕКС® J53
(розчин для дезінфекції)
листівка-вкладка

Опис

Рідина темно-коричневого кольору

Склад

100 мл препарату містить діючу речовину (г):

йод (у вигляді сполуки з поверхнево-активними речовинами) – 2,75;

Допоміжні речовини: алкілалкоголь етоксилат, кислота сірчана, кислота фосфорна, кислота метансульфонова, вода.

Фармацевтична форма

Розчин для дезінфекції.

Фармакологічні властивості

АТС – vet класифікаційний код: QV07AV - Технічні дезінфектанти.

Препарат має активну протимікробну дію по відношенню до грампозитивних та грамнегативних бактерій (*Mycobacterium fortuitum*, *Bacillus* spp., *Staphylococcus* spp., *Streptococcus* spp., *Salmonella* spp., *Pseudomonas aeruginosa*, *Proteus vulgaris*, *Escherichia coli*, *Bacillus subtilis* та *Clostridium perfringens*, грибів (*Candida* spp., *Aspergillus* spp., *Fusarium* spp., *Penicillium* spp.), вірусів (щодо збудників хвороб Ньюкасла (*Newcastle disease virus*), Гамборо (*Bursal disease virus*), хвороби Тешена (*Teschovirus*), цирковірусної інфекції (*Porcine circovirus type 2*), класичної чуми свиней (*Classical swine fever virus*), респіраторно-репродуктивного синдрому (*Porcine reproductive and respiratory syndrome virus*), хвороби Ауєскі (*Aujeszky's disease virus*), трансмісивного гастроентериту (*Transmissible gastroenteritis coronavirus*), паратрипу ВРХ (*Bovine parainfluenza-3 virus*), вірусної діареї ВРХ (*Bovine viral diarrhoea virus*), інфекційного ринотрахеїту (*Bovine alphaherpes virus 1*), вірусу грипу типу А та вірусу синдрому зниження яйценосності (*Egg drop syndrome virus* (EDSV).

Застосування

Препарат застосовують для дезінфекції тваринницьких та птахівничих приміщень, інкубаторіїв, систем подачі питної води, забійних та м'ясопереробних цехів, продовольчих ринків, місць утримання дрібних тварин і птахів, обладнання та інвентарю, технологічного устаткування, апаратури, тари, поверхонь інструментів, спецодягу на об'єктах агропромислового комплексу, ветпунктах, лабораторіях, клініках і аптеках ветеринарної медицини, на підприємствах виробництва ветеринарних препаратів, транспортних засобів, а також на інших об'єктах, що підлягають ветеринарному нагляду.

Дозування

Дезінфекцію проводять після ретельної механічної та санітарної очистки поверхонь об'єктів знезараження. Дезінфекцію проводять методом протирання, зрошення, піноутворення, туманоутворення (аерозольне розпилення) та занурення/заповнення.

Робочі розчини засобу, призначені для дезінфекції різних об'єктів, готують у пластмасових, емальованих (без ушкодження емалі) ємкостях шляхом додавання до води відповідних кількостей дезінфікуючого засобу (табл. 1). Для дезінфекції використовують водні розчини засобу.

Препарат зберігає свою активність при інтенсивному освітленні, при використанні твердої води, в присутності залишків органічних матеріалів (гній, сеча, залишки корму тощо), діє в широкому діапазоні температур: від 0 до 50°C.

Таблиця 1. Приготування робочих розчинів засобу ДЕЗІРЕКС® J53

Концентрація розчину (%) за препаратом	Кількість інгредієнтів (мл), необхідна для приготування робочого розчину:			
	1 л		10 л	
	Дезірекс® J53	Вода	Дезірекс® J53	Вода
0,4	4,0	996,0	40,0	9960,0
0,5	5,0	995,0	50,0	9950,0
1,0	10,0	990,0	100,0	9900,0
2,0	20,0	980,0	200,0	9800,0
3,0	30,0	970,0	300,0	9700,0

Таблиця 2. Дезінфекція методом протирання, зрошення (спрею) або методом генерування піни

Вид дезінфекції	Об'єкт обробки	Концентрація робочого розчину, %	Витрати розчину, л /м²	Час експозиції, хв.
Профілактична дезінфекція	Поверхні	0,4	0,2-0,25	120
		0,5		30
Вимушена дезінфекція (поточна та заключна) при інфекційних захворюваннях бактеріальної та вірусної етіології	Поверхні	0,5	0,2-0,25	60
		1,0		30
Вимушена дезінфекція (поточна та заключна) при спалаху особливо небезпечної хвороби (сибірка)	Поверхні	2,0	0,2-0,25	120
		3,0		60

Дезінфекція настилу, транзитних ванн, ванночок для дезінфекції інструментів – засіб розводиться у співвідношенні 1:200 (0,5%). Янтарний колір розчину свідчить про його ефективність. При знебарвленні розчину необхідно замінити його на новий (через 1-7 діб).

Дезінфекція повітря – використовується метод холодного туманоутворення у співвідношенні 1:400 (0,25%) – 1:500 (0,2%), або метод термального туманоутворення у 3,0% концентрації.

Система подачі води – систему потрібно звільнити та наповнити її розчином засобу, розведеного у співвідношенні 1:200 (0,5%). Через 30 хв. розчин зливається і система промивається чистою водою. Для дезінфекції питної води використовується розчин засобу у співвідношенні 1:2500 (0,04%).

Дезінфікуючі ванни для кінцівок тварин - для транзитних щоденних ванн засіб розводиться у співвідношенні 1:200 – 1:100 (0,5-1,0%), для стаціонарних ванн - 1:100 – 1:50 (1,0-2,0%). Про ефективність розчину свідчить його янтарне чи коричневе забарвлення. Після знебарвлення розчину його слід замінити.

Дезінфекція і миття в молочній промисловості – збірні цистерни для молока, обладнання. Потрібно звільнити цистерну, витягти пробку та підводний вимірювач і помити їх в розчині 1:400 (0,25%). Внутрішня поверхня цистерни очищується за допомогою щітки. Через 30 хв. цистерна з кришкою миється чистою водою і лишається висихати. Інструменти обробляються таким же чином, але без ополіскування.

Протипоказання

Не встановлені.

Застереження

Не застосовувати в присутності тварин і птиці. Після обробки приміщення необхідно провітрити.

До роботи допускаються особи не молодше 18 років.

Дезінфекцію методом зрошення проводять із дотриманням заходів щодо захисту органів дихання, шкіри та очей (спецодяг, універсальний респіратор, захисні окуляри, гумові рукавиці).

Роботи, пов'язані із застосуванням розчинів препарату методом протирання та змочування, проводять з використанням засобів захисту шкіри: в комбінезоні (халаті), фартусі, шапочці, гумових рукавицях.

За умови недотримання застережних заходів при попаданні засобу на шкіру і в очі можливі місцеві подразнювальні реакції з наступним розвитком гіперемії, набряку і слъзотечі.

При появі ознак подразнення органів дихання необхідно припинити роботу із засобом, постраждалого негайно вивести на свіже повітря або в інше приміщення. Рот і носоглотку прополоскати водою, звернутись до лікаря.

При випадковому потраплянні засобу в очі необхідно терміново промити їх проточною водою протягом 10-15 хв. та звернутися до лікаря.

У разі випадкового потраплянні препарату на шкіру, потрібно ретельно промити уражену ділянку проточною водою, після цього змастити шкіру пом'якшуючим кремом.

При випадковому потраплянні засобу в шлунок необхідно дати випити постраждалому декілька склянок води з 10-20 подрібненими таблетками активованого вугілля та звернутись до лікаря. Забороняється палити, пити, приймати їжу під час виконання робіт з дезінфекції.

Після закінчення роботи обличчя і руки слід вимити водою з милом.

Форма випуску

Флакони та каністри із полімерних матеріалів місткістю 100,0250,0500 мл; 1, 2, 5, 10 л та діжки по 200 л.

Зберігання

Зберігати в тарі виробника при температурі від 0°C до 35°C у сухих, темних, вентильованих складських приміщеннях у захищеному від прямого сонячного проміння місці. речовин.

Термін придатності

3 роки.

Для застосування у ветеринарній медицині!