

СУМІСНІСТЬ



Амістар® Голд можна змішувати з іншими загальноновживаними пестицидами на відповідній культурі. Проте в кожному конкретному випадку слід перевіряти препарати на сумісність.

ТЕМПЕРАТУРА ЗАСТОСУВАННЯ



Застосовувати при температурі не вище за +25 °С. Робочий розчин треба використати протягом 24 год після приготування.

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ



10–12 мл препарату розраховано для приготування 8–10 л робочого розчину. Перед застосуванням збовтати флакон. Розчин готувати безпосередньо перед початком обприскування.



syngenta.

03022, м. Київ,
вул. Козацька, 120/4, 3-й поверх

тел.: +380 (44) 494 17 71
факс: +380 (44) 494 17 70

Консультаційний центр
0 800 50 04 49
Безкоштовно зі стаціонарних
телефонів в Україні

www.syngenta.ua

ДЕТАЛЬНІШЕ



НОВИНКА

УНІВЕРСАЛЬНИЙ ІНСТРУМЕНТ У СИСТЕМІ ЗАХИСТУ



Амістар® Голд

syngenta.

Амістар® Голд

syngenta.

Розкриймо потенціал рослини разом

Новий надійний фунгіцид від комплексу хвороб із винятковими лікувальними властивостями відтепер у дрібному фасуванні. Незамінний помічник садівника-городника з офіційною реєстрацією для роздрібного продажу на суниці, винограді й газоні.



Повна назва	Амістар® Голд
Вміст діючої речовини	Азоксистробін, 125 г/л + дифеноконазол, 125 г/л
Хімічна група	Стробілурины, триазоли
Препаративна форма	Концентрат суспензії
Клас токсичності	II
Упаковка	40 мл, 100 мл

ГОЛОВНІ ПЕРЕВАГИ ПРЕПАРАТУ

- Діє на всі стадії розвитку хвороби: профілактична, лікувальна і захисна дії
- Надійний захист винограду, суниці, газону проти широкого спектра хвороб
- Тотальний контроль ключових хвороб на газоні у період вегетації
- Висока ефективність завдяки подвійній дії активних інгредієнтів
- Тривалий захисний період

ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕПАРАТУ

Культура	Шкідливі об'єкти	Норма витрати препарату	Норма витрати робочої рідини	Кратність обробок / Термін очікування
Дозволено для роздрібного продажу				
Суниця	Плямистості листя (бура, біла), борошниста роса	10–12 мл на 5 л води	5 л на сотку	2/30
Виноград	Оїдіум, мільдю, антракноз	10–12 мл на 8–10 л води	1,5–2 л розчину на кущ	2/30
Газон	Плямистості листя	10–12 мл на 5 л води	5 л на сотку	2/–
Дозволено для застосування в промисловому секторі				
Соняшник	Альтернاریоз, фомоз, іржа, септоріоз, фомосис, біла гниль	5–10 мл на 3–5 л води	3–5 л розчину на сотку	2/30
Цукровий буряк	Борошниста роса, церкоспороз, рамуляріоз, фомоз	5–10 мл на 3–5 л води	3–5 л розчину на сотку	2/30
Соя	Борошниста роса, септоріоз, пероноспороз, антракноз, аскохітоз, альтернاریоз, церкоспороз	5–10 мл на 3–5 л води	3–5 л розчину на сотку	2/30
Виявлено високу ефективність препарату під час наукових досліджень				
Хвойні	Шуте, побуріння глиці, іржа	10 мл на 8–10 л води	2–4 л розчину на дерево залежно від розміру крони	2/–



ГОЛОВНІ ОСОБЛИВОСТІ

- Обприскування найкраще проводити профілактично або при появі перших ознак хвороби
- Лікувальна дія на культурі — до 3 днів
- Дві діючі речовини в складі запобігають виникненню резистентності
- Містить діючу речовину природного походження
- Підвищує врожайність завдяки стимулюванню рослини
- Формуляція препарату дозволяє ефективно утримувати краплю робочого розчину на листовій поверхні
- Не рекомендується проводити обробки по вологій листовій поверхні або якщо очікуються опади протягом 2,5–3 год після обробки
- Сумісний із більшістю інсектицидів на відповідних культурах при збіганні термінів очікування
- Допомогає рослинам протистояти складним погодним умовам

ЕТАПИ РОЗВИТКУ ЗБУДНИКІВ ХВОРОБИ

Проростання спор	Проникнення збудника в клітину	Розвиток міцелію, поява візуальних симптомів	Спороутворення
Превентивна дія Завдяки азоксистробіну найвища ефективність дії досягається при превентивних обробках, до моменту зараження	Лікувальна дія Має виражену лікувальну дію проти більшості збудників хвороб, яка проявляється у знищенні патогену (на ранніх стадіях розвитку захворювання) і блокуванні подальшого розвитку хвороби (на пізніших стадіях)		Антиспорулянтна дія Амістар® Голд, на відміну від інших фунгіцидів, чинить на збудників хвороб антиспорулянтну дію