

12.07.2021

Бровермектин гранулят
(порошок для перорального застосування)
листівка-вкладка

Опис

Гранульований порошок від білого до злегка кремового кольору.

Склад

1 г препарату містить діючу речовину:

івермектин - 3,5 мг.

Допоміжні речовини: токоферолу ацетат, лактоза, кальцію карбонат, глюкоза, крохмаль картопляний.

Фармакологічні властивості

АТС vet QP54, ендектоциди (QP54AA01, івермектин)

Івермектин (22,23-дигідроавермектин В₁) – напівсинтетичне похідне продукту біосинтезу актиноміцетів виду *Streptomyces avermitilis*, одного із авермектинів, що належить до групи макроциклічних лактонів (син.: антипаразитарні макроліди чи ендектоциди) із класу антибіотиків.

Механізм дії препарату на організм паразита полягає в стимулюванні виділення гамма-аміномасляної кислоти, яка через інтернейрони вентрального нервового стовбура нематод та нервово-м'язові сполучення членистоногих, блокує передавання нервових імпульсів, що, в свою чергу, призводить до паралічу і загибелі цих паразитичних організмів.

Івермектин швидко всмоктується, досягаючи максимальної концентрації у плазмі крові (близько 50 мкг/л) через 4 години після введення дози 12 мг. Він розподіляється по усіх тканинах, але повільно і в обмеженій кількості проникає в оболонки ока. Період напіввиведення становить 28 годин. Виводиться майже виключно з фекаліями.

Застосування

свиней — статевозрілими і личинковими формами нематод *Ascaris suum*, *Melastromylus elongatus*, *M. salmi*, *Macracanthozkyncrus hirudinaceus*, *Ollulanus tricuspis*, *Strongyloididae ransomi*, *Trichonematidae Strongylata*, *Trichuris suis*; кліщами видів *Demodex phyllides*, *Sarcoptes parvula*, *S. suis* та ентомозами (воші) – *Haematopinus suis*;

кролів — нематодами *Passalurus ambiguous*, *Trichostrongylus colubriformis*, *T. axei*; акарозами (кліщами) *Psoroptes cuniculi*, *Cheyletiella parasitovorax*, *Listophorus gibbusta* блохами *Spilopsyllus cuniculi* основними переносниками міксоматозу;

м'ясоїдних тварин (собак, котів) — нематодами *Toxocara canis*, *Toxocara mystax*, *Toxascaris leonina*, *Ancylostoma caninum*, *Ancylostoma tubacforma*, *Capillariosis canum*, *Dirofilaria immitis*, *Dirofilaria repens*, *Thelazia callipaeda*, *Thelazia rhodesi*, *Thelazia gulosa*, *Thelazia skrjabini*, *Trichuris vulpis*; акарозами (кліщами) *Cheyletiella jaszguri*, *Demodex canis*, *Notoedres cati*, *Otodectes cynotis*, *Sarcoptes canis* та нашкодними паразитами видів *Ctenocephalides canis*, *Linognathus setotus*, *Trichodectis canis*.

Дозування

Препарат доцільно застосовувати груповим методом.

Для свиней груп дорощування і відгодівлі препарат застосовують у дозі 2 г/10 кг маси тіла. Розраховану дозу препарату змішують з 7-добовою нормою комбікорму і таку лікувально-кормову суміш (ЛКС) згодовують впродовж 7 діб, відповідно до встановленого режиму годівлі.

Собакам і котам застосовують препарат із розрахунку 2 г/10 кг маси тіла. Розраховану дозу ділять на 3 частини і згодовують з м'ясним фаршем 3 доби поспіль. Можливе індивідуальне застосування препарату у таких же дозах.

Кролям для дегельмінтизації препарат застосовують у дозі 1 г/10 кг маси тіла. Розраховану дозу препарату змішують із 3-добовою нормою комбікорму і згодовують впродовж трьох діб. При наявності збудників ектопаразитозів, через тиждень після першого курсу лікування, обробку повторюють аналогічним методом. Одночасно необхідно провести лезакаризацію приміщень дозволеними (зареєстрованими) інсекто-акарицидними засобами.

12.07.2021

Протипоказання

Не застосовувати собакам дрібних порід та цуценятам до 6 місячного віку!

Застереження

При змішуванні препарату з кормом важливо забезпечити рівномірне перемішування, що досягається шляхом ступінчастого (наростаючого) внесення компонентів.

Забій свиней на м'ясо дозволяють через 21 добу, а кролів – через 16 діб після останнього використання препарату.

Форма випуску

Пакети або контейнери з полімерних матеріалів по 10, 50, 100, 500, 1000 г.

Зберігання

Сухе, прохолодне, темне місце за температури від мінус 10 °С до 25 °С.

Термін придатності

3 роки.

Для застосування у ветеринарній медицині!

Власник реєстраційного посвідчення

ТОВ "БРОВАФАРМА"

б-р Незалежності 18-а, м. Бровари, Київська обл., 07400, Україна

Виробник готового продукту

ТОВ "БРОВАФАРМА"

б-р Незалежності 18-а, м. Бровари, Київська обл., 07400, Україна

КОНТРОЛЬОВАНИЙ
ПРИМІРНИК № 1