

24. 12. 2020

Броваферан-100
(розчин для ін'єкцій)
листівка-вкладка

Опис

Розчин червоно-бурого кольору.

Склад

1,0 мл препарату містить діючу речовину (мг):
декстрановий комплекс тривалентного заліза 100,0.

Допоміжна речовина: вода високоочищена.

Фармакологічні властивості

АТС-vet класифікаційний код: QB03AC Препарати тривалентного заліза для парентерального застосування.

Комплексна сполука гідроокису заліза і низькомолекулярного декстрану поповнює дефіцит заліза, стимулює кровотворну систему, підвищує рівень гемоглобіну, сприяє збільшенню кількості еритроцитів та покращує збереженість молодняку свійських тварин.

Застосування

Профілактика і терапія залізодефіцитної анемії у свійських тварин, особливо у поросят і телят.

Дозування

Броваферан-100 вводять глибоко внутрішньом'язово в області стегна або шиї. Перед введенням препарат підігрівають на водяній бані до температури тіла.

Дози з профілактичною метою (одноразово на 1 тварину, мл):

поросята 3-4 добового віку	1,5-2;
телята 5-6 добового віку	8-10;
ягнята 3-5 добового віку	2-3;
норки	0,3-0,5;
свиноматки (за 3-4 тижні до опоросу)	10.

За наявності в господарстві тварин із ознаками анемії, з лікувальною метою препарат вводять 2-3 рази з тижневим інтервалом у тих же дозах.

Протипоказання

Не застосовувати тваринам з ознаками гострого Е-авітамінозу та заниженого вмісту селену.

Застереження

У місці введення можливе виникнення невеликого набряку, що зникає за декілька діб.

Антациди сповільнюють засвоєння заліза.

Одночасне застосування з ацетогідроксамовою кислотою знижує ефективність обох препаратів; із препаратами заліза — можливе накопичення заліза в печінці.

Одночасне застосування із препаратами групи тетрациклінів — знижує їх ефективність. Можливе застосування із 2-3-годинним проміжком.

У комбінації із токоферолом знижується ефективність обох препаратів.

Одночасне застосування із холестираміном знижує ефективність препаратів заліза, із етидреновою кислотою — знижується ефективність останньої. Можливе застосування із 2-годинним проміжком.

Форма випуску

Флакони зі скла або полімерних матеріалів, об'ємом 10, 20, 50, 100, 200 і 250 мл.

Зберігання

Сухе темне місце при температурі від 3 до 25 °С (не допускати замерзання!).

Термін придатності — 3 роки.

Термін придатності після першого відбору із флакону — 24 години.

Для застосування у ветеринарній медицині!

Власник реєстраційного посвідчення та виробник готового продукту

ТОВ «БРОВАФАРМА»

б-р Незалежності, 18-а, м. Бровари, Київська обл., 07400, УКРАЇНА