


Бродлайн Спот-Он

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Бродлайн Спот-ОН – новейший препарат, разработанный **специально для кошек**
- Эффективная защита **от 20 видов внутренних и внешних паразитов**
- Наружное применение – легко для Вас, **минимум стресса для Вашей кошки**
- Сохранение эффективности даже при мытье с шампунем³
- Для котят с 7 недель** и взрослых кошек
- Иновационный аппликатор** – аккуратность применения и точность дозировки
- Разработка **Merial** (Франция) – гарантия качества



СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ



1. Разрезать
блister
ножницами
по линии
отреза.
Извлечь
аппликатор
из упаковки.

2. При вертикаль-
ном положении
аппликатора
оттянуть поршень
вниз.
3. Наконечник
повернуть
и снять.

4. Раздвинуть
шерсть
по средней
линии шеи между
основанием
черепа и лопат-
ками и выдавить
все содержимое
аппликатора
непосредственно
на кожу
в одно место.

Бродлайн Спот-ОН относится к комбинированным противопаразитарным лекарственным препаратам. Входящие в состав препарата фипронил, (S)-метопрен, эприномектин и празиквантел обеспечивают его широкий спектр действия в отношении энто- и эндопаразитов кошек: блох *Ctenocephalides felis* (половозрелые и преимагинальные фазы развития блох); власоедов *Felicola subrostratus*; иксодовых клещей *Dermacentor variabilis*, *Rhipicephalus sanguineus*, *Ixodes scapularis*, *Ixodes ricinus*, *Haemaphysalis longicornis*, *Haemaphysalis flava*, *Haemaphysalis campanulata*; желудочно-кишечных нематод *Toxocara cati* (личинки L3, L4, неполовозрелые и взрослые формы), *Ancylostoma tubaeforme* (личинки L4 и взрослые формы), *Toxascaris leonina* и *Ancylostoma braziliense* (половозрелые формы); нематод мочевого пузыря *Capillaria plica*; легочных нематод *Aelurostrongylus abstrusus*, *Capillaria* spp.; личинок дирофилиарий *Dirofilaria immitis*; цестод *Dipylidium caninum*, *Taenia taeniaformis*, *Echinococcus multilocularis* (все фазы развития).

Перед применением препарата Бродлайн Спот-ОН внимательно ознакомьтесь с инструкцией.

¹Bussières et al. 1997; Beugnet et al. 2000; Mircean et al. 2010; Barutzki and Schaper, 2011; Capari et al. 2013

²Beck et al. 2006; Bonds et al. 2007; Farkas et al. 2008; Beugnet et al. 2010

³дважды в месяц

Бродлайн Спот-ОН

Эффективная защита
от 20 внутренних и внешних паразитов



Для тех, кто любит кошек

ВНУТРЕННИЕ ПАРАЗИТЫ



До 30 % кошек поражены гельминтами¹



Более 10 видов гельминтов паразитируют в организме кошки

4 из них являются общими для кошки и человека



Риск заражения гельминтами возрастает, если:

- отсутствует регулярная профилактика гельминтозов
- кошка питается сырой рыбой и мясом
- кошке позволяет контакт с пищей человека
- у владельца нет привычки мыть руки после общения с кошкой
- хозяин не использует перчатки при чистке кошачьего лотка

СИМПТОМЫ



Внутренние паразиты

- Истощение
- Тусклая шерсть
- Расстройство пищеварения
- Рвота

Внешние паразиты

- Тусклая шерсть
- Расчесы
- Беспокойство
- Анемия



Особенно важно, если:

- ◆ Кошка активно гуляет и охотится на улице
- ◆ Возраст кошки до 6 месяцев
- ◆ Кошка живет в семье, где есть маленькие дети
- ◆ В доме содержится более одного животного

Применять Бродлайн Спот-Он ЕЖЕМЕСЯЧНО



До 70 % кошек заражены блохами²



Блохи – одна из основных причин аллергического дерматита

Блохи являются переносчиками инфекционных заболеваний:
- риккетсиоза
- микоплазмоза
- фелиноза или «болезни кошачьих царапин» (острого инфекционного заболевания человека, вызываемого бактерией Бартонеллой)



Иксодовые клещи доставляют беспокойство кошкам укусами и являются переносчиками болезни Лайма (борелиоза) – также общей для человека и кошки



Домашние кошки ПОДВЕРЖЕНЫ РИСКУ ЗАРАЖЕНИЯ гельминтами и блохами.

Яйца блох и гельминтов можно занести в дом на обувь или одежду.

СИМПТОМЫ ЗАРАЖЕНИЯ КОШКИ ПАРАЗИТАМИ МОГУТ БЫТЬ НЕЗАМЕТНЫ ДЛительное время.

ВНЕШНИЕ ПАРАЗИТЫ

ЭТО ВАЖНО!