




DUPONT

PIONEER.

2016

НОВІ ГІБРИДИ ПІОНЕР®

Технологія Optimum® AQUAMax®

Що робить гібриди Optimum® AQUAMax® особливими?

Продукти Optimum® AQUAMax® є результатом унікальних 50-річних наукових досліджень компанії DuPont Pioneer в різних кліматичних середовищах, головною метою яких є пошук надійних рішень для отримання максимально можливої урожайності та зниження впливу ризиків від недостатнього вологозабезпечення через синхронізацію цвітіння, потужну кореневу систему, тривалий «стейгрін», ефективність роботи продихів.

Якими були додаткові вимоги та показання для включення гібридів у лінійку Optimum® AQUAMax®?

В умовах українського ринку Optimum® AQUAMax® є єдиним науково перевіреним продуктом, відібраним на основі специфічної продуктивності. Головною вимогою було отримання як мінімум на 3% вищої урожайності над стандартами в звичайних умовах та 5% в умовах з недостатнім вологозабезпеченням. В якості стандартів використовували найбільш поширені продукти-лідери ринку.

В цьому році ми пропонуємо п'ять нових високоефективних гібридів кукурудзи в лінійці Optimum® AQUAMax®.

Перший представник лінійки AQUAMax® в Україні П9175 з гідністю пройшов випробування як у демонстраційних полях компанії Піонер, так і у промислових посівах. У 2014 році П9175 висівався по всій території України — від Полісся до Степу — і забезпечив середню урожайність на рівні 9 т/га. Максимальний результат, який вдалося зафіксувати на демонстраційних полях, сягнув 16,3 т/га.

Враховуючи побажання українських аграріїв ми пропонуємо на ринок нові гібриди лінійки AQUAMax®, які покликані задовольнити попит товаровиробників в усіх групах стиглості — починаючи із ФАО 260 і закінчуючи ФАО 480. Гібрид П0216 (ФАО 480) минулого року в Угорщині забезпечив середню урожайність 11 т/га, а П8523 (ФАО 260) — 10 т/га.

Наша програма селекції Optimum® AQUAMax® продовжується і є одним з найбільш важливих проектів створення нових гібридів кукурудзи.



Підвищена ефективність роботи продихів (краще використання доступної вологи)

Швидше викидання рилець (покращена закладка зернівок)

Довші зернівки (отримання врожаю в умовах стресу пізнього сезону)

Добре розвинена ефективна коренева система (краще поглинання води із ґрунту)



Коли дощить — вони сяють, коли сухо — вони буяють

У цьому році ми пропонуємо українським виробникам наступні гібриди Optimum® AQUAMax®:

www.pioneer.ua



Зміст


Технологія Optimum® AQUAmax™	2
Середньоранні гібриди кукурудзи	4
Р8521/П8521 ФАО 220	4
Р8025/П8025 ФАО 230	6
Р8523/П8523 ФАО 260	8
Р8816/П8816 ФАО 300	10
Середньопізні гібриди кукурудзи	12
РР38А75/ПР38А75 ФАО 330	12
Р9911/П9911 ФАО 440	14
Високоолеїнові гібриди соняшнику	16
Р64НН98/П64ГГ98 RM 45.....	16
Гібриди ярого ріпаку	18
РР45Н75/ПР45Г75.....	18
Асортимент кукурудзи Піонер® у сезоні 2016 року.....	20
Асортимент соняшнику Піонер® у сезоні 2016 року	21
Асортимент озимого ріпаку Піонер® у сезоні 2016 року.....	22
Асортимент ярого ріпаку Піонер® у сезоні 2016 року	23
Асортимент сорго Піонер® у сезоні 2016 року	23
Силосні інокулянти Піонер®	23



П8521
ФАО 220 зубоподібний



Високопродуктивний гібрид із стійкістю до стеблового вилягання



Придатність до строків посіву



Придатність до мінімального обробітку



Придатність до пізнього збирання



Віддача води




Придатність до монокультури



Посухостійкість




Рекомендована густина перед збиранням, тис. росл./га



- Простий гібрид із зубоподібним типом зерна
- Гібрид зернового напрямку з дуже доброю вологовіддачею
- Середньоросла рослина з оптимальним кріпленням качана
- Має надзвичайно високий потенціал урожайності зерна
- Добра посухостійкість
- Гарна толерантність до сажок
- Стійкість до гельмінтоспоріозу добра
- Використання: зерно, силос

Середня урожайність П8521 в різних зонах вирощування



Рекомендується:

- уникати надто ранніх та пізніх строків посіву;
- уникати пізнього збирання;
- застосовувати післясходові гербіциди виключно у відповідності до фаз розвитку культури.

P8521






П8025
ФА0 230 кременистоподібний



Високоврожайний гібрид із гарною адаптацією до умов вирощування



Придатність до строків посіву



Придатність до мінімального обробітку



Придатність до пізнього збирання



Віддача води




Придатність до монокультури



Посухостійкість




Рекомендована густина перед збиранням, тис. рослин/га



- Простий гібрид із кременистоподібним типом зерна
- Середньоросла рослина з оптимальним кріпленням качана
- Має надзвичайно високий потенціал урожайності зерна
- Добра посухостійкість
- Добра толерантність до летючої та пухирчастої сажок
- Добра стійкість до гельмінтоспоріозу
- Використання: зерно, крупа

Середня урожайність П8025 в різних зонах вирощування



Рекомендується:

- застосовувати післясходові гербіциди виключно у відповідності до фаз розвитку культури;
- придатний до вирощування у монокультурі.

P8025






П8523
ФАО 260
 зубовий

Optimum
AQUAmax



Максимально ефективне використання наявної вологи



Придатність до строків посіву



Придатність до мінімального обробітку



Придатність до пізнього збирання



Віддача вологи



Придатність до монокультури



Посуhostійкість



Рекомендована густина перед збиранням, тис. рослин/га


Зволоження:



- Простий гібрид із зубовим типом зерна
- Гібрид зернового напрямку з дуже доброю вологовіддачею
- Високорослий гібрид із оптимальним кріпленням качана
- Пристосований до жарких та посушливих умов вирощування

- Високий потенціал урожайності
- Толерантність до летючої сажки дуже висока – гібрид придатний для вирощування у монокультурі
- Добра стійкість до вилягання
- Гарна реакція на добрий агрофон
- Використання: зерно, крохмаль, спирт

Середня урожайність П8523 в різних зонах вирощування



Рекомендується:

- здійснювати сівбу в оптимальні строки;
- дотримуватись максимально допустимої густоти посіву.

P8523






П8816
ФАО 300
 зубовий



Високоврожайний гібрид з доброю посухостійкістю та вологовіддачею



Придатність до строків посіву



Придатність до мінімального обробітку



Придатність до пізнього збирання



Віддача води




Придатність до монокультури



Посухостійкість




Рекомендована густина перед збиранням, тис. рослин/га



- Простий гібрид із зубовим типом зерна
- Гібрид із дуже високим потенціалом урожайності
- Добра стійкість до гельмінтоспоріозу та кукурудзяних гнилей
- Посухостійкість та жаростійкість добра
- Гарна стійкість до стеблового вилягання та сажок
- Використання: зерно, спирт

Середня урожайність П8816 в різних зонах вирощування



Рекомендується:

- уникати посіву в місцях із значними осінніми опадами;
- уникати надто ранніх строків посіву та посіву на перезволожених ґрунтах, де є ризик кореневого полягання.

P8816






ПР38А75
ФА0 330 восковидний



Середньопізній простий гібрид з восковидним типом зерна



Придатність до строків посіву



Придатність до мінімального обробітку



Придатність до пізнього збирання



Віддача води




Придатність до монокультури



Посухостійкість




Рекомендована густина перед збиранням, тис. рослин/га



- Простий гібрид із восковидним типом зерна
- Гібрид, що вирощують на зерно з метою подальшого виробництва крохмалю
- Гібрид, придатний до раннього посіву
- Добра стійкість до стеблового вилягання
- Посухо- та жаростійкість дуже добра
- Толерантність до летючої сажки висока
- Використання: зерно, крохмаль, спирт

Середня урожайність ПР38А75 в різних зонах вирощування



Рекомендується:

- для вирощування в монокультурі (кукурудза по кукурудзі);
- вирощувати на доброму агрофоні.

PR38A75






П9911
ФАО 440
 зубовий

Optimum
AQUAmax



Максимально ефективне використання наявної вологи



Придатність до строків посіву



Придатність до мінімального обробітку



Придатність до пізнього збирання



Віддача вологи



Придатність до монокультури



Посуhostійкість



Рекомендована густина перед збиранням, тис. рослин/га


Зволоження:



- Простий гібрид із зубовим типом зерна
- Гібрид зернового напрямку з дуже доброю вологовіддачею
- Високорослий гібрид із високим кріпленням качана
- Високий потенціал урожайності

- Пристосований до жарких та посушливих умов вирощування
- Толерантність до розповсюджених хвороб кукурудзи гарна
- Використання: спирт, зерно

Результативність П9911 у Румунії, середнє за 3 роки



Рекомендується:

- здійснювати сівбу в оптимальні строки;
- вирощувати на доброму агрофоні;
- не використовувати в монокультурі;
- уникати пізнього збирання.

P9911






П64ГГ98
RM 45

високоолеїновий



Високий вміст олеїнової кислоти



стійкість до вовчка
соняшникового
5 рас (А-Е)



висока
олійність

Посухостійкість

Олійність

Толерантність до:


фомопсису

білої гнилі кошику

білої гнилі стебла

Стійкість до несправжньої борошнистої роси


Рекомендована густина перед збиранням, тис. рослин/га



- Середньостиглий простий гібрид з високим вмістом олії
- Стійкість до 5-ти рас (А-Е) вовчка

- Висота рослин – нижче середньої
- Має добру посухостійкість

Середня урожайність П64ГГ98 в різних зонах вирощування



Рекомендується:

- для вирощування переважно в Степу і Лісостепу;
- не рекомендується вирощувати після дводольних попередників.

P64HH98





ПР45Г75

звичайний високорослий



Висівати з нормою

700 000–800 000 насінин/га,

щоб густина перед збиранням становила

450 000–500 000 рослин/га

За технологією

No-Till

норму висіву насіння
необхідно збільшити

до **1** млн/га


Насіння упаковане в паперові мішки по 2 млн насінин, з розрахунку на 2,5–2,85 га, протруєне препаратами.

Гібрид	Тип	Вегетаційний період	Висота рослин, см	Рекомендована норма сівби, тис. насінин/га	Опт. густина стояння навесні, тис. рослин/га
PR45H75	звичайний високорослий	98–100 днів	100–110	700–800	450–500

Гібрид ярого ріпаку ПІОНЕР® PR45H75 створені традиційними методами селекції без застосування генної інженерії. Ці гібриди придатні до вирощування як за технологією Clearfield® із застосуванням гербіциду Нопосаран® компанії БАСФ, так і за традиційною технологією із застосуванням гербіцидів, які зареєстровані для ріпаку в Україні.

Гібриди ярого ріпаку ПІОНЕР® належать до низькоерукового та низькоглюкозинолатного типу (00-тип); мають високу посухостійкість, добру стійкість до пероноспорозу, бактеріозу, вилягання та осипання і є придатними до прямого комбайнування завдяки рівномірному досягненню. Гібриди добре реагують на ранні строки посіву та інтенсивну агротехніку. Є придатними до вирощування за технологією No-Till.

PR45H75



Асортимент кукурудзи Піонер® у сезоні 2016 року

Гібрид	Одиниць ФАО	Тип зерна *	Використання	Віддача вологи	Посушуватість	Придатність до:			Придатність до строків посіву					Рекомендована густота перед збиранням для низького та високого агрофону, тис. рослин/га**	
						монокультури з урахуванням наявної толерантності до сажкових хвороб	мінімального обробітку	пізнього збирання	дуже ранні	ранні	оптимальні	пізні	дуже пізні		
Ранньостиглі															
P7709 *	190	З	зер., спирт	👍👍	👍👍	прид.	так	ні	–	–	+	–	–	80–90	65–70
PR39A50	200	КП	зер., круп.	👍	👍👍	малопрід.	так	ні	+	+	+	+	–	80–95	70–75
PR39G12	200	К	зер., сил., круп.	👍👍	👍👍	малопрід.	ні	ні	+	+	+	+	–	80–95	70–75
PR39H32	200	КП	зер., круп.	👍	👍👍	дуже прид.	ні	ні	+	+	+	+	+	80–95	70–75
Середньоранні															
PR39W45	220	П	зер., сил.	👍👍	👍	прид.	так	ні	–	+	+	+	–	80–90	65–70
P8025 *	230	КП	зер., круп.	👍	👍👍	прид.	так	ні	–	+	+	+	–	80–90	65–70
P8521 *	220	ЗП	зер., сил.	👍👍	👍👍	прид.	ні	так	–	+	+	+	–	80–90	65–70
P8000	230	ЗП	зер., сил.	👍👍	👍	прид.	ні	ні	–	–	+	+	–	80–90	65–70
PR39G83	230	ЗП	зер., сил., спирт	👍👍	👍👍	дуже прид.	так	так	–	–	+	+	–	80–90	65–70
PR39R86	250	КП	зер., сил., круп.	👍	👍	прид.	ні	ні	–	+	+	–	–	75–80	65–70
PR39T13	250	КП	зер., сил.	👍👍	👍👍	дуже прид.	так	так	–	+	+	+	–	75–80	65–70
P8523 *	260	З	зер., крохм., спирт	👍👍👍	👍👍	дуже прид.	ні	ні	–	–	+	–	–	75–80	65–70
PR39D81	260	ЗП	зер., крохм., спирт	👍👍👍	👍👍	малопрід.	так	так	–	+	+	+	–	75–80	65–70
P8529	280	ЗП	зер., спирт	👍👍	👍👍	прид.	так	ні	–	+	+	+	–	75–80	65–70
PR39B76	280	З	зер., спирт	👍👍👍	👍👍	дуже прид.	так	ні	–	–	+	+	–	75–80	65–70
P8745 *	280	П	зер., сил., спирт	👍👍	👍👍	прид.	так	так	–	+	+	–	–	75–80	65–70
PR39F58	290	З	зер., сил., спирт	👍👍	👍	прид.	так	ні	–	+	+	–	–	75–80	65–70
P8659	290	З	зер., спирт	👍👍	👍	прид.	так	так	–	–	+	–	–	75–80	65–70
PR39R20	290	КП	зер., круп.	👍	👍	прид.	ні	ні	–	+	+	–	–	75–80	65–70
PR38Y34	290	КП	зер., сил., круп.	👍	👍	прид.	так	так	+	+	+	+	–	70–75	60–65
P8816 *	300	З	зер., спирт	👍👍👍	👍👍👍	малопрід.	так	так	–	+	+	–	–	70–75	60–65
Середньостиглі															
P9000	310	П	зер., спирт	👍👍	👍👍👍	прид.	так	ні	–	+	+	+	–	70–75	60–65
PR38N86	320	ЗП	зер., спирт	👍👍👍	👍👍	прид.	так	так	–	+	+	–	–	70–75	60–65
PR38A75 *	330	В	зер., крохм., спирт	👍👍	👍👍	прид.	так	так	–	+	+	–	–	70–75	60–65
P9025	330	П	зер., сил., спирт	👍👍	👍👍	прид.	так	так	–	+	+	–	–	70–75	60–65
PR38A79	330	ЗП	зер., спирт	👍👍👍	👍👍	прид.	так	так	–	+	+	+	–	70–75	60–65
P9175 *	330	З	зер., крохм., спирт	👍👍	👍👍👍	прид.	так	ні	–	–	+	–	–	70–75	65–70
P9400	340	ЗП	зер., спирт	👍👍	👍👍	прид.	так	так	–	+	+	–	–	70–75	60–65
P9578	350	З	зер., крохм., спирт	👍👍👍	👍👍	прид.	так	ні	–	+	+	–	–	70–75	60–65
P9241 *	360	З	зер., крохм., спирт	👍👍	👍👍👍	прид.	ні	так	–	+	+	–	–	70–75	60–65
P9721 *	380	З	зер., крохм., спирт	👍👍👍	👍👍👍	малопрід.	ні	так	–	–	+	–	–	60–65	55–60
PR38A22	390	В	зер., крохм., спирт	👍	👍👍	дуже прид.	так	так	–	–	+	–	–	60–65	55–60
PR38A24	390	ЗП	зер., крохм., спирт	👍👍	👍👍	дуже прид.	так	так	–	+	+	–	–	60–65	55–60
PR37Y12	390	ЗП	зер., сил., крохм., спирт	👍👍👍	👍👍👍	прид.	так	так	–	+	+	–	–	60–65	55–60
PR37N01	390	ЗП	зер., спирт	👍👍👍	👍👍	прид.	так	ні	–	+	+	–	–	60–65	55–60
Середньопізні															
P9911 *	440	З	зер., спирт	👍👍👍	👍👍👍	малопрід.	ні	ні	–	–	+	–	–	55–60	50–55
PR37F73	440	З	зер., сил., крохм., спирт	👍👍👍	👍👍👍	прид.	так	так	–	–	+	–	–	60–65	55–60
P0216 *	480	З	зер., спирт	👍👍👍	👍👍👍	прид.	ні	ні	–	–	+	–	–	55–60	50–55
PR35F38	490	ЗП	зер., спирт	👍👍👍	👍👍👍	прид.	так	так	–	+	+	–	–	55–60	50–55

* Тип зерна: К — кременистий; КП — кременистоподібний; П — проміжний; ЗП — зубоподібний; З — зубовий; В — восковидний.

** У разі вирощування гібридів на силос норму висіву необхідно збільшити на 15–20% від рекомендованої.

👍 Добра 👍👍 Дуже добра 👍👍👍 Відмінна * Новинка

Асортимент соняшнику Піонер® у сезоні 2016 року

Гібрид	RM*, днів	Вегетаційний період, днів	Тип**	Придатність до гербіцидної технології***	Макс. одноразова норма гербіциду Експрес® 75 в.г., г/га	Стійкість до вовчка соняшникового (раси)	Стійкість до неспр. борошністої роси	Характеристики в балах***					Рекомендована густота перед збиранням, тис. рослин/га ****		Pioneer Protector®	
								олійність	посухостійкість	Толерантність до			Зона зволоження		вовчок соняшниковий	несправжня борошніста роса
										фомопсису	білої гнилі					
											кошикова форма	стеблова форма	достатнього	недостатнього		
Скоростиглі (<100 днів)																
P63LL01	33	100	Л		0	A–E	++	7	7	6	7	7	60–65	55–60		
Ранньостиглі (101–110 днів)																
PR63A62	36	104	Л		0	A–E	++	8	8	7	8	7	55–60	50–55		
P63LE10	37	106	Л	E	50	A–E	++	7	7	8	7	7	55–60	50–55		
PR63A86	38	107	Л		0	A–E	++	8	7	7	7	6	55–60	50–55		
PR64G46	39	109	Л		0	нові після E	++	7	7	7	7	6	55–60	50–55	☑	
PR63A90	40	110	Л		0	A–E	+	5	7	8	6	6	55–60	50–55		
P64LE11	40	110	Л	E	50	A–E	++	5	7	8	6	6	55–60	50–55		
Середньоранні (111–115 днів)																
P63LL06 *	41	112	Л		0	A–E	++	6	7	7	7	7	55–60	50–55		
PR64A15	41	112	Л		0	A–E	+	8	9	6	6	7	55–60	50–55		
PR64F50	43	115	Л		0	A–E	++	6	9	8	8	7	55–60	50–55		
PR64H32	43	115	BO		0	A–E	++	7	7	6	7	6	55–60	50–55		
PR64H34	43	115	BO		0	нові після E	++	6	8	6	6	6	55–60	50–55	☑	
PR64F66	43	115	Л		0	нові після E	+	6	8	7	7	6	55–60	50–55	☑	
P64LE25 *	43	115	Л	E	50	нові після E	+++	6	7	7	7	6	55–60	50–55	☑	☑
Середньостиглі (116–125 днів)																
P64HH98 *	45	117	BO		0	A–E	++	6	9	7	7	6	55–60	50–55		
PR64A71	46	119	Л		0	нові після E	+	6	7	8	7	7	55–60	50–55	☑	
PR64E71	46	119	Л	E	25	нові після E	+	6	7	7	7	7	55–60	50–55	☑	
P64LE20	46	119	Л	E	50	нові після E	+++	5	7	8	7	7	55–60	50–55	☑	☑
P64LC53 *	46	119	Л	C	0	нові після E	+++	6	7	6	6	7	55–60	50–55	☑	☑
P64LE19	48	122	Л	E	50	A–E	+++	6	7	7	7	7	55–60	50–55		☑
PR64A89	49	124	Л		0	A–E	+	6	8	7	8	7	55–60	50–55		
P64LE99 *	49	124	Л	E	50	нові після E	+++	6	8	7	7	7	55–60	50–55	☑	☑

* RM — відносна стиглість, кількість днів від закінчення цвітіння до фізіологічної стиглості (побуріння кошика);

RM30 — 95 днів від появи сходів до фізіологічної стиглості. Кожна наступна одиниця RM дорівнює 1,5 дня вегетаційного періоду.

** Л — лінолевий, BO — високоолеїновий. *** E — ExpressSun®; C — Clearfield®. **** Оцінка характеристик у балах від 1 до 9 за даними DuPont Pioneer. **** Низький/високий агрофон.

1 – не стійкий, 9 – дуже стійкий.

* Новинка

Асортимент озимого ріпаку Піонер® у сезоні 2016 року

Гібрид	Стиглість	Вміст олії	Висота рослин, см*	Вміст глюкози-нолатів, мкмоль/г	Рання сівба	Пізня сівба	Осінній розвиток	Весняне відростання	Час цвітіння
Звичайний високорослий									
PR46W14	середньо-пізній	дуже високий	160–170	10,5–15,0	ні	так	дуже швидкий	середнє	середнє
PR46W20	середньо-пізній	надзвичайно високий	155–165	11,0–14,5	так	так	повільний	середньо-раннє	середнє
PR44W22	ранньо-стиглий	надзвичайно високий	155–165	11,0–14,5	так	ні	повільний	середнє	середнє
PR46W21	середньо-пізній	надзвичайно високий	155–165	11,0–14,5	ні	так	швидкий	середньо-раннє	середньо-раннє
PT200CL	середньо-пізній	дуже високий	160–170	12,0–14,1	так	так	дуже швидкий	середньо-раннє	середньо-ранній
Maximus (напівкарликовий)									
PR45D03	середньо-стиглий	високий	120–130	12,0–14,0	так	так	відносно повільний	пізнє	середнє
PR44D06	ранньо-стиглий	надзвичайно високий	130–140	12,0–14,0	так	ні	відносно повільний	дуже пізнє	пізнє
PR45D05	середньо-ранній	дуже високий	120–130	12,0–14,0	ні	так	відносно повільний	дуже пізнє	середнє
PX100CL	ранньо-стиглий	дуже високий	130–140	12,0–14,0	так	так	відносно повільний	середньо-пізнє	ранній

* За середньостатистичних умов.

Рекомендована норма сівби — 50 насінин/м².

Оптимальна густина стояння на весні — 35–45 рослин/м².

Асортимент ярого ріпаку Піонер® у сезоні 2016 року

Гібрид	Веgetаційний період	Висота рослин, см	Рекомендована норма сівби, тис. насінин/га	Опт. густота стояння навесні, тис. рослин/га
PR45H72	98–100 днів	100–110	700–800	450–500
PR45H73	97–99 днів	100–110	700–801	450–501
PR45H75 *	98–100 днів	100–110	700–800	450–500

* Новинка

Асортимент сорго Піонер® у сезоні 2016 року

Тип	Гібрид	Веgetаційний період	Тип зерна	Вміст таніну	Висота рослин, см	Опт. густота стояння навесні, тис. рослин/га
ФАО 430	PR88Y41/Космосол	103–108 днів*	білозерний	Відсутній	115–117	100–120
ФАО 450	PR88Y20	110–115 днів*	білозерний	Відсутній	119–121	100–120

* За середньостатистичних умов.

Силосні інокулянти Піонер®

Інокулянт	Культура	Ефект при застосуванні	Упаковка	Об'єм силосної маси, що піддається обробці інокулянтом	Установка
11H50/11X50	Силосування люцерни	Регулювання та модифікація ферментації силосу із люцерни	Флаконт, 200 г	250 тонн	Appli-Pro®/Апплі-Про®
11AFT/11AFT			Флаконт, 250 г	250 тонн	Appli-Pro®/Апплі-Про®
11C33/11Ц33	Силосування кукурудзи	Покращення якості силосу та збільшення терміну зберігання	Флаконт, 250 г	250 тонн	Appli-Pro®/Апплі-Про®
11CFT/11ЦФТ		Значне покращення поживної цінності та термінів зберігання силосу	Флаконт, 250 г	250 тонн	Appli-Pro®/Апплі-Про®
11G22/11Г22	Силосування злакових трав і зернових	Покращення якості силосу та збільшення терміну зберігання	Флаконт, 250 г	250 тонн	Appli-Pro®/Апплі-Про®
11GFT/11ГФТ				250 тонн	Appli-Pro®/Апплі-Про®
11B91/11Б91	Силосування кукурудзи з підвищеним вмістом вологи	Регулювання та модифікація ферментації силосу кукурудзи з підвищеним вмістом вологи	Флаконт, 250 г	250 тонн	Appli-Pro®/Апплі-Про®



Овальний логотип DuPont є зареєстрованим торговельним знаком DuPont.
®,™ — торговельні знаки Pioneer. © 2015 РНІІ

Шановний господарю!

Будь ласка, звертайтеся до наших колег із запитаннями.
Ми з радістю надамо Вам вичерпні відповіді
та поділимось своїми знаннями і досвідом.
Ми також чекаємо на Ваші зауваження та пропозиції.

ТОВ «Піонер Насіння Україна»
04070, м. Київ, вул. Спаська, 30 а
Тел.: +38 044 496-30-07, 496-30-05
Факс: +38 044 496-30-06
www.pioneer.ua